Guía Fotográfica de Aves
Cantón Shushufindi



Reserva Biológica
Limoncocha

GEOPARK

La Reserva Biológica Limoncocha Alberga una gran cantidad de biodiversidad con una destacada presencia de aves teniendo un registro de 526 especies de aves según la plataforma Ebird (The Cornell Lab Ornithology), es así que la observación de aves se ve como una gran oportunidad para el desarrollo turístico del Cantón Shushufindi como un destino para observar aves.

Desde el año 2017 la Reserva Biológica Limoncocha ha venido participando en conteos de importancia mundial, como el Global Big Day (Conteo Mundial de aves) y en conteo navideño de aves de Audubon, (conteo de aves más antiguo del mundo con más de 100 años), con el objetivo de tener registro de las aves que existen dentro del Área Protegida y la Zona de Influencia del Cantón Shushufindi a demás como parte de una nueva oferta turística, estos evento se los realizo con la participación de estudiantes, guías locales, fotógrafos y jóvenes de las nacionalidades y personal del Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica. Es parte de una estrategia para promocionar y fortalecer las actividades del Aviturismo en el Cantón Shushufindi y la Reserva Biológica Limoncocha. La presente Guía fotográfica de aves busca dar a conocer una parte de la diversidad de aves que existen en Cantón Shushufindi.

Ing. Juan Neira Rivera

Responsable de la Reserva Biológica Limoncocha (E)

Desde nuestra fundación como compañía asumimos el compromiso de valorar los recursos naturales y realizar todos nuestros esfuerzos para contribuir al cuidado y a la protección del medioambiente. Por eso, nos unimos a esta Guía de Aves, seguros de que aportará al conocimiento y preservación de las especies de aves en la región.

Preservar la riqueza de la biodiversidad es un propósito global que se inscribe en la agenda de sostenibilidad promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las empresas, desde cada uno de los sectores en los que nos desempeñemos, estamos llamadas a sumar en este propósito, y en línea con nuestra responsabilidad social y corporativa, aportar los recursos económicos, humanos y todos los que sean necesarios para alcanzarlo.

El conocimiento es clave para la toma de decisiones y como compañía estamos firmemente convencidos de que en la medida en que tengamos más conocimiento de la biodiversidad que nos rodea, seremos capaces de generar medidas más efectivas y responsables para aportar a su conservación.

En esa medida, estamos seguros de que esta publicación representa el primer paso para seguir aportando a la ciencia y contando con el conocimiento y los datos necesarios para apoyar en la creación y desarrollo de estrategias de conservación que nos permitan proteger y valorar la biodiversidad de la región y del Ecuador.

María Gabriela Moreta
Gerente Ambiental y de Relaciones con Vecinos de GeoPark

GEOPARK

Las Aves que existe en Limoncocha tiene sus propia historia, su singular caracteristicas que le hace diferente de la una y la otra logrando el interes de las aves en todo el mundo.

Las aves como los hoatzines son vestigios de hace millones de años es una ave prehistorica y poder observar más de cien individuos en la Laguna de Limoncocha es todo un Privilegio.

El área protegida es un paraiso no solo para las aves si no para todo ser viviente que habita en ella.

Las aves se elevan con el viento hacia el cielo, libres, observado el bosque humedo tropical. Donde hay aves existe vida.

Tnlg. Jesenia Castillo
Guardaparque de la Reserva Biológica Limoncocha

Equipo Tecnico

Elaborado por:
Juan Neira
Jesenia Castillo
Darwin Vivanco
Apoyo Personal Reserva Biologica Limoncocha
Favian Grefa
Edwin Tapuy
Diogenes Andi

Esta publicación fue elaborada por la Reserva Biológica Limoncocha

Para descargar la versión digital de esta publicación, así como sus anexos, por favor dirigirse a la página web del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, en la sección
"Documentos"areasprotegidas.ambiente.gob.ec

INDICE

Presentación
Introducción
Descripcion de la Reserva Biológica Limoncocha
Recomendaciones para observar aves
Anatomia de las aves
Galería fotografica y descripcion de aves
Bibliografia

Foto: Jorge Vela

Presentación

Esta guía fotográfica es la recopilación de fotos tomadas por personal del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica - Sucumbíos que labora diariamente en el campo, guias, ciudadania que participan de los conteos de aves . con el objetivo de que sea un instrumento para las personas interesadas en aviturismo ya sea profesional o aficionado que pueda identificar las aves en el campo y sea más satisfactoria su visita al área protegida esta guía fotográfica tiene como acciones fortalecer y promocionar el aviturismo responsable y sostenible acorde a la realidad del área protegida y cuenta con 150 fotografías de las aves que se puede observar en Limoncocha. Para facilitar a los turistas nacionales y extranjeros esta guía fotográfica contara con los nombres; comunes, inglés y nombres científicos que les pueda resultar más familiar en la dentificación de las especies de aves.

Introducción.

En razón de la increíble variedad de aves que existe en el Cantón Shushufindi se ha desarrollado el interés de turistas nacionales y extranjeros que viajan a largo y ancho del subcontinente para observar las aves.

Las aves y sus forma de vida que ofrece la naturaleza con: sus coloridos plumaje y cantos. El turismo Ornitológico o más conocido con el aviturismo está en auge día a día hay más demanda de personas que se interesan por realizar esta actividad de observación de avifauna en la Reserva Biológica Limoncocha, y por ende a través del aviturismo involucramos a las omunidades indígenas receptora de visitantes maximizado la economía local.

El turismo es una de las principales actividades económicas del mundo, convirtiéndose en una estrategia para el MAATE fortalecer el desarrollo local y aliviar la pobreza de las comunidades, lugares que contiene alta concentración de avifauna.

Descripción de la Reserva Biológica Limoncocha

La RBL fue declarada mediante Acuerdo Ministerial Nº 394, del 23 de septiembre de 1985, el mismo que fue publicado en el Registro Oficial Nº 283 de octubre del mismo año. Los límites y la superficie de la RBL, fueron modificados mediante Acuerdo Ministerial Nº 359 del 29 de agosto de 1986, publicado en el Registro Oficial Nº 534 del 1º de octubre del mismo año, quedando la superficie actual de la RBL en 4.613,25 ha.

El Ecuador forma parte de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Convención de Ramsar) desde enero de 1991. Esta convención certifico a la RBL, como un sitio Ramsar a nivel mundial, el 10 de julio de 1998.

La importancia de los humedales para la conservación radica en que estos almacenan agua, mitigan inundaciones, controlan la erosión, sirven para carga y descarga de acuíferos, aportan a la purificación del agua, entre otros.

Sitios de Visita

La Laguna de Limoncocha es el principal atractivo, tiene 7 km de largo y 3 km de ancho, una profundidad de 3mts. Los recorridos en la laguna dura un promedio de una hora donde podrás observar una gran cantidad de especies de aves acuáticas y en la noche se realiza los recorridos de observación de Caimanes.

El Sendero el Caimán, es otro atractivo que puedes visitar el recorrido es de 2 km y la duración de 1hora aproximadamente podrás observar arboles de gran inmensidad como los ceibos, higuerones entre otros; aquí podrás observa aves de bosque de tierra firma como los saltarines, hormigueros.

Diversidad de Especies

Peces; 93 especies, pirañas, sabaleta, Sardinas, Palometa, Barbudos, Raspabalsa, Anguila, Raya entre otros.

Aves: 506 Registradas; Oropéndolas, Cacique, Jacana, Búhos, Gritador Unicornio, Garzas.

Primates: 5 Especies; Mono Aullador, Barizo, Leoncillo –Mono de Bolsillo, Chichico Negro, Cotoncillo Rojo.

La especie Emblemática Caimán Negro (Melanosuchus niger)

Equipos para observación de aves

ANATOMIA DE LAS AVES



Barbudo Coronirojo

Se trata de un barbudo bastante grande con característico pico robusto. Se plumaje es distintivo: mayormente marrón con pecho anaranjado y corona roja (blanquecina o anteada en la hembra). Es poco probable confundirlo con otros barbudos. Presta atención a parejas presentes en el dosel, las cuales a menudo se alimentan de algún un árbol con frutos o se posan tranquilamente en una rama abierta. Emite trinos repetidos en serie, similares a aquellos producidos por ranas.

Nombre científico: Capito aurovirens
Dimensiones: 18-20cm

Scarlet-crowned Barbet

Foto: Jorge Vera

It is a fairly large bearded bird with a characteristic robust bill. Its plumage is distinctive: mostly brown with orange breast and red crown (whitish or buffy in female). It is unlikely to confuse it with other bearded birds. It looks out for pairs in the canopy, which often feeds on a fruiting tree or perch quietly on an open branch. It emits repeated trills in series, similar to those produced by frogs.

Cabezón Dorado

Barbudo grande y contrastantemente marcado del bosque lluvioso de tierras bajas. El plumaje es variable: la garganta y el pecho varían de amarillo a rojo, mientras que el resto del cuerpo está marcado en amarillo y negro. Se encuentra en una variedad de hábitats desde el borde del bosque hasta el bosque lluvioso maduro. Su canto se escucha a larga distancia y puede distinguirse de otros barbudos por su patrón: una serie de ululeos dobles que se acelera.

Nombre científico: Capito auratus
Dimensiones: 17-18 cm

Gilded Barbet

Foto: Jorge Vera

Large, contrastingly marked bearded bird from the lowland rainforest. Its plumage is variable: its throat and breast vary from yellow to red, while the rest of its body is marked in yellow and black. It is found in a variety of habitats from the forest edge to mature rainforest. Its song is heard from a long distance and can be distinguished from other bearded birds by its pattern: a series of double hooting that is accelerated

.

Monja Frentinegra

Pájaro algo grande y oscuro de los bosques de tierras bajas y bordes. El pico rojo es llamativo se encuentra típicamente en los bosques más jóvenes y en los bordes del bosque en lugar de en los bosques maduros. Se percha en las ramas expuestas en los niveles medio y superior del bosque, a veces permanecen inmóviles durante largos períodos. A menudo, andan en pares o grupos.

Nombre científico: Monasa nigrifrons
Dimensiones: 26-28 cm

Black-fronted Nunbird

Foto: Jorge Vera

Somewhat large and dark bird from lowland and edge forests. The striking red bill is typically found in younger forests and at forest edges rather than in mature forests. It perches on exposed branches in the middle and upper levels of the forest, sometimes remaining immobile for long periods. They often walk in pairs or groups.
Natural regions: Amazonian Tropical Humid Forest, Eastern Montane Forest, Eastern Piemontan Forest

Hoatzin

Ave grande y rechoncha que se encuentra alrededor de los bordes de lagos y arroyos de movimiento lento. La cabeza parece demasiado pequeña para su gran cuerpo marrón. Su mohawk naranja, piel azul facial y pico rechoncho hacen esta ave extremadamente distintiva. Usualmente encontrado en grupos o pares. Se mueve torpemente alrededor de la vegetación a la orilla del agua, haciendo ruidos fuertes

Hoatzin

Foto: Jorge Vera

Large, plump bird found around the edges of slow-moving lakes and streams. The head seems too small for its large brown body. Its orange mohawk, blue facial fur, and stubby bill make this bird extremely distinctive. Usually found in groups or pairs. It awkwardly moves around vegetation at the water's edge, making loud noises.

Chachalaca Jaspeada

Ave grande parecida a una gallina, pero más pequeña que los guans y los curassows. Uniformemente marrón con el cuello y la cabeza escamados, y piel desnuda roja en la garganta que puede ser difícil de ver. Se encuentra más comúnmente en los bordes del bosque, incluso a lo largo de ríos y alrededor de áreas agrícolas. Las llamadas fuertes y estridentes a menudo se escuchan al amanecer y al atardecer, cuando las llamadas de un individuo a menudo inician un coro de llamadas de otras chachalacas en el área.

Nombre científico: Ortalis guttata
Dimensiones: 49-60 cm

Foto: Jorge Vera

Speckled Chachalaca

Large chicken-like bird, but smaller than guans and curassows. It is uniformly brown with scaly neck and head, and red bare skin on throat that can be difficult to see. It is most commonly found on forest edges, including along rivers and around agricultural areas. Its loud shrill calls are often heard at dawn and dusk, the calls from an individual often start a chorus of calls from other chachalacas in the area.

Cormorán Neotropical

Cuerpo negro. Los inmaduros tienen el pecho marrón oscuro. La piel facial anaranjada llega a un punto y es bordeada por una delgada línea blanca. Se sumerge bajo el agua para capturar peces. A menudo se percha con alas abiertas para secarlas. Es la especie de cormorán más ampliamente distribuida desde américa del norte a américa del sur.

Nombre científico: Phalacrocorax brasilianus
Dimensiones: 69-74 cm

Neotropic Cormorant

Foto: Jorge Vera

With a Black body. The immature ones have a dark brown breast. Orange facial skin comes to a point and is bordered by a thin white line. It dives underwater to catch fish. It often rests with open wings to dry. It is the most widely distributed cormorant species from North America to South America.

Gritador Unicornio

Se encuentra cerca de pantanos de agua dulce y ríos en las tierras bajas de la Amazonía. Es mayormente gris oscuro y negro, tiene escamas blancas en el cuello y el vientre blanco. Su nombre hace referencia al apéndice característico, como de unicornio, en la parte superior de su cabeza. Camina en las orillas de los ríos y se percha en la vegetación junto al agua, a veces bastante alto. El canto puede escucharse a grandes distancias (eBird, 2020)

Nombre científico: Anhima cornuta
Dimensiones: 84-92 cm

Horned Screamer

Foto: Jorge Vera

It is found near freshwater swamps and rivers in the lowlands of the Amazon. It is mostly dark gray and black, has white scales on the neck and a white belly. Its name refers to the characteristic unicorn-like appendage on the top of its head. It walks on the banks of rivers and rests in the vegetation by the water, sometimes quite high. Its Singing can be heard at great distances (eBird, 2020)

Cacique Lomiamarillo

Ave común relacionado a los bolseros encontrado en el dosel del bosque de tierras bajas y bordes desde Panamá hasta Brasil. En su mayoría de color negro con la rabadilla, parte inferior de la cola y parches de ala amarillos brillantes. Sexo similares. El pico pálido es largo y puntiagudo; el ojo es azul pálido. Inconfundible en su rango: el único cacique de tierras bajas con extenso plumaje amarillo. Al igual que muchos de susparientes, emite una gran variedad de llamadas. Anida colonialmente, construyendo nidos colgantes en forma de bolsa

Nombre científico: Cacicus cela
Dimensiones: 24-29 cm

Yellow-rumped cacique

Foto: Jorge Vera

A common bird related to the purse tree. It can be found in the lowland forest canopy and in the edges from Panama to Brazil. Mostly black with bright yellow rump, underside of tail and wing patches. Similar sexes. The pale bill is long and pointed; the eye is pale blue. Unmistakable in rank: the only lowland chieftain with extensive yellow plumage. Like many of his relatives, he makes a wide variety of calls. It Nests colonially, building hanging bag-shaped nests.

Martin Pescador Grande

El martín pescador más grande de América con pico excepcionalmente grande y llamadas estridentes. Gris a zul con cresta desgreñada, c ollar blanco y vientre r ojizo. M acho y hembra son similares, pero observa el patrón diferente del pecho: totalmente rojizo en el macho, mientras que la hembra tiene una banda gris azulada bordeada por blanco. Con frecuencia visible, buscando peces en aguas poco profundas desde una percha prominente y parloteando ruidosamente cuando es perturbado. Solo o pares, también se observan a menudo volando alto y dando fuertes llamadas "keck"..

Nombre científico: Megaceryle torquata
Dimensiones: 38-41cm

Rigend Kingfisher

Foto: Jorge Vera

The largest kingfisher in America with an exceptionally large bill and shrill calls. It is Blue and gray with a shaggy crest, white collar and reddish belly. Male and female are similar to each other, but with a different breast pattern: totally reddish in the male, while the female has a blue-gray band bordered in white. It is often visible, searching for fish in shallow water from a prominent perch and chattering loudly when disturbed. It can be found alone or in pairs, they are also often seen flying high and giving loud "keck" calls.

Martin Pescador Verde

Martín pescador pequeño con un pico desproporcionadamente largo. Verde oscuro brillante arriba con garganta, collar y puntos en las alas blancos. Con frecuencia sostiene la cola levantada. Las plumas externas de la cola son blancas con manchas verdes conspicuas en vuelo. El macho tiene el pecho rojizo; la hembra tiene pecho blanco con manchas verde formando dos bandas. Se encuentra a lo largo de ríos o estanques. Menos conspicuo que algunos otros martines pescadores, a menudo se perchan en ramas colgantes cerca de la superficie del agua. Vuelo bajo con aleteos rápidos.

Nombre científico: Chloroceryle americana
Dimensiones: 18-20 cm

Green Kingfisher

Foto: Jorge Vera

Small kingfisher with disproportionately long bill. It is Glossy dark green at the top, with white throat, collar and wingtips. It often holds the tail raised. Its outer tail feathers are white with conspicuous green spots in flight. The male has a reddish chest; the female has a white breast with green spots forming two bands. It is found along rivers or ponds. It is less conspicuous than some other kingfishers, they often rest on dangling branches near the surface of the water. It flies low with fast wing beats

Martín Pescador Verdirrufo

Martín pescador bastante pequeño, único con su espalda verde y vientre completamente ferruginoso. Más similar a American Pygmy Kingfisher, pero casi el doble de grande, y sin el vientre inferior blanco de American Pygmy. Ambos sexos son similares, pero la hembra tiene una banda verde moteada en el pecho. Encontrado solo a lo largo de corrientes de movimiento lento o pantanos. Generalmente es visto perchado discretamente justo por encima del agua.

Green-and-rufous Kingfiseher

Small kingfisher, unique with its green back and completely rusty belly. Most similar to the American Pygmy Kingfisher, but almost twice as large, and without the American Pygmy's white lower belly. Both sexes are similar, but the female has a mottled green band on the chest. Found only along slow moving streams or swamps. It is generally seen perched discreetly just above the water

Garza Tigre

Esta garza de tamaño mediano es encontrada alrededor de pantanos y arroyos lentos. Los adultos son distintivos con su brillante cabeza y cuello ferruginoso.
Los juveniles son beige con barras negras desiguales; muy similar a juvenil de Fasciated Tiger-Heron. Usualmente visto solo.



Nombre científico: Tigrisoma lineatum
Dimensiones: 66-76 cm

Rufuscent Tiger-Heron

Foto: Jorge Vera

This medium-sized heron is found around swamps and slow streams. The Adult is distinctive with its shiny head and rusty neck. Juveniles are beige with uneven black bars; very similar to juvenile Fasciated Tiger-Heron. Usually seen alone

Garza Estriada

Garza pequeña muy ampliamente distribuida, común en gran parte del mundo. El tamaño pequeño y el color mayormente gris la separan de la mayoría de otras garzas y avetoros. Busca la gorra oscura contrastante, distintos bordes claros en las plumas de las alas, y rayas blancas y rojizas en la parte delantera del cuello. El juvenil es más rayado por abajo que el adulto. Similar al Green Heron de Norteamérica, pero nota el cuello mayormente gris con poco rojizo. Normalmente solitaria, se encuentra perchada tranquilamente en humedales, como pantanos, campos agrícolas, ríos y lagos

Nombre científico: Butorides striata
Dimensiones: 35-43cm

Striated Heron

Foto: Humberto Castillo

Very widely distributed small heron, commonly found in much of the world. Its small size and mostly gray color set it apart from most other herons and bitterns. Look for the contrasting dark cap, distinct light edging on the wing feathers, and red and white stripes down the front of the neck. The juvenile is more striped below than the adult. It is Similar to the Green Heron of North America, but note the mostly gray neck with little reddish. Usually found alone, it peacefully rests in wetlands, such as swamps, agricultural fields, rivers and lakes.

Garceta Grande

Garza blanca grande, con pico amarillo como una daga. Con patas largas y negras. Forrajea en humedales poco profundos acechando a sus presas muy despacio. Es la garza blanca más grande y la más ampliamente distribuida.

Regiones Naturales: Bosque Deciduo de la Costa, Bosque Húmedo Tropical Amazónico, Bosque Húmedo Tropical del Chocó, Bosque Montano Occidental, Bosque Montano Oriental, Bosque Piemontano Occidental, Matorral Interandino, Matorral Seco de la Costa, Páramo, Galápagos

Nombre científico: Ardea Alba
Dimensiones: 90-105 cm

Great Egret

Foto: Juan Neira

Large white heron, with a yellow beak similar to a dagger. With long black legs, it forages in shallow wetlands stalking its prey very slowly. It is the largest and most widely distributed white heron.

Ave Fría Sureña

Patrón de color distintivo con pecho negro, vientre blanco, cabeza gris y hombros bronceados. Alas contrastantemente marcadas en vuelo. A menudo en pares o pequeñas bandadas en una variedad de hábitats abiertos, usualmente cerca del agua pero también en pastizales secos. La llamada áspera y fuerte es una buena pista de su presencia

Nombre científico: Vanellus chilensis
Dimensiones: 33-36 cm

Southern Lapwing

Foto: Jorge Vera

It has a Distinctive color pattern with black chest, white belly, gray head, and tan shoulders. With Contrastingly marked wings in flight. They can be found in pairs or small flocks in a variety of open habitats, usually near water but also in dry grasslands. Their harsh, loud call is a good clue to their presence.

Garza Cuca Cocoi

Grande y delgada con la espalda gris azulada, cuello blanco y gorra negra. Ampliamente distribuida y conspicua (aunque no abundante) en marismas, ríos y lagos desde Panamá hasta el sur de Chile y Argentina, usualmente a elevaciones bajas. Se puede ver solo o en congregaciones con otras garzas. Donde el rango traslapa con Great Blue Heron, busca el cuello blanco y una gorra negra más extensa.

Nombre científico: Ardea cocoi
Dimensiones: 100-130 cm

Cocoi Heron

Foto: Jesenia Castillo

It is a Large and slim bird with a blue-gray back, white collar, and black cap. Widely distributed and conspicuous (though not abundant) in marshes, rivers, and lakes from Panama to southern Chile and Argentina, usually at low elevations. It can be seen alone or in congregations with other herons. Where the range overlaps with Great Blue Heron, look for the white collar and a more extensive black cap.

Garza Agamí

Solitaria, garza raramente vista de tierras bajas húmedas tropicales. Se encuentra a lo largo de riachuelos en bosques y localmente en manglares. Camina lenta y sigilosamente cazando desde el borde del agua o desde una rama baja que cuelga sobre el agua. Nota el pico muy largo y delgado, con punta en forma de puñal. El plumaje del adulto es mayormente oscuro, con hermosas plumas plateadas en el cuello. El inmaduro es más pardusco, sin las plumas del cuello.

Nombre científico: Agamia agami
Dimensiones: 64-74 cm

Agami Heron

Foto: Jorge Vera

Distinct light edging on the wing feathers, and red and white stripes down the front of the neck. The juvenile is more striped below than the adult. It is Similar to the Green Heron of North America, but note the mostly gray neck with little reddish. Usually found alone, it peacefully rests in wetlands, such as swamps, agricultural fields, rivers and lakes.

Carrao

Ave grande tipo garza, que podría recordar a un ibis pero está más estrechamente relacionado con los rálidos. De color marrón con manchas y rayas blancas, más densas en la cabeza y el cuello. El pico amarillento largo es ligeramente decurvado. Se encuentra en pantanos o ciénagas, a menudo con árboles y arbustos, pero también se ve regularmente en los bordes de los estanques en parques de la ciudad altamente manejados. Se alimenta casi exclusivamente de caracol manzana. Usualmente solo o en parejas. La vocalización distintiva es un grito fuerte y estridente, a menudo escuchado como un extraño efecto de sonido de selva en las películas

Nombre científico: Aramus guarauna
Dimensiones: 60-70 cm

Limpkin

Foto: Jorge Vera

Large heron-like bird, which might resemble an ibis but is more closely related to rails. It is Brown with white spots and stripes, denser on its head and neck. Its long yellowish bill is slightly curved. It is found in swamps or bogs, often with trees and shrubs, but it is also regularly seen on pond edges in highly managed city parks. It feeds almost exclusively on apple snail. It is usually found alone or in pairs. Its distinctive vocalization is a loud, shrill scream, often heard as a strange jungle sound effect in movies

Garceta Nívea

Garza blanca de tamaño mediano. Con pico largo, delgado y negro. Lorum amarillo (área entre el ojo y el pico). Los adultos tienen patas negras y pies amarillos. Los inmaduros tienen patas y pies amarillo verdosos. Forrajea en humedales. A menudo, con un estilo de alimentación más activo que Great Egret que se mueve muy lentamente. Más pequeño que Great Egret; también observa el pico negro de Snowy. Un poco más grande que Cattle Egret y más propensa a tener sus pies en el agua en lugar de caminar en pastizales.

Snowy Egret

Foto: Jorge Vera

Medium sized white heron. With long, thin, black bill. Yellow lorum (area between eye and beak). Adults have black legs and yellow feet. Juveniles have greenish-yellow legs and feet. It forages in wetlands. Often with a more active feeding style than Great Egret that moves very slowly. Smaller than Great Egret; also notice Snowy's black peak, which is slightly larger than Cattle Egret and more likely to have their feet in water rather than walking in grasslands.

Jacana

Pájaro de pantano, de tamaño mediano con dedos excepcionalmente largos. En algunas regiones el adulto es completamente negro; en otras poblaciones es más similar a Northern Jacana con las partes superiores marrón rojizas. Siempre tiene la frente y barbas de la base del pico rojas. Los juveniles son muy parecidos a los de Northern Jacana: marrón bronceado arriba con parte inferior y ceja blancas; nota el pico amarillo y los dedos largos para separarlos de otras aves de pantanos. Todas las edades muestran las alas amarillas en vuelo. Se encuentra en humedales, usualmente con una combinación de gramíneas y lirios.

Nombre científico: Jacana jacana
Dimensiones: 20-23 cm

Carunculat Wattled Jacana

Foto: Jorge Vera

Striking, medium-sized swamp bird with exceptionally long toes. In some regions the adult is completely black; in other populations it is more similar to Northern Jacana with reddish brown upperparts. It always has a red forehead and beard at the base of its beak. Juveniles are very similar to Northern Jacana: tan brown above with white underside and brow; note its yellow bill and long fingers to distinguish them from other swamp birds. All ages show yellow wings in flight. They are found in wetlands, usually with a combination of grasses and lilies.

Garza Azul

Garza oscura de tamaño mediano. El pico largo es azul pálido en la base y más oscuro en la punta. Los adultos son mayormente azul grisáceo, con la cabeza y el cuello color morado que contrasta con el cuerpo. Los inmaduros son blancos en su primer año, con frecuencia muestran manchas azul grisáceo en su primera primavera. Con patas amarillo-verdosas. Forrajea en humedales. Se mueve lentamente a través de las aguas poco profundas con el cuello extendido. Cuerpo más alargado que Snowy Egret.

Nombre científico: Egretta caerulea
Dimensiones: 55-76 cm

Little Blue Heron

Foto: Jorge Vera

Medium-sized dark heron. Its long beak is pale blue at the base and darker at the tip. Adults are mostly blue-gray, with a purple head and neck that contrasts with the rest of their body. The Fledgling ones are white in their first year, often showing grayish-blue spots in their first spring. They have greenish-yellow legs. It forage in wetlands. It moves slowly through the shallow water with its extended neck. Its body is longer than Snowy Egret.

Aninga

Ave de cuello largo que se encuentra en pantanos rodeados de árboles, ciénagas y estanques artificiales. Los machos son negros con blanco en las alas, las hembras son similares, pero con cuello y cabeza parduscos. Se sumerge bajo el agua y arponea peces con su pico parecido a un puñal. A menudo nada manteniendo sólo la cabeza y el cuello fuera del agua. Al igual que los cormoranes, se percha en lo abierto para extender sus alas y secar las plumas. Forma relativamente similar a los cormoranes, pero con la cola más larga y con un pico claramente puntiagudo. Ocasionalmente sube muy alto.

Foto: Jorge Vera

Anhinga

Long-necked bird mostly found in swamps surrounded by trees, bogs, and man-made ponds. The males are black with white on the wings, the females are similar to the males, but with a brownish neck and head. It dives underwater and harpoons fish with its dagger-like beak. They often swim with only their head and neck out of the water. Like cormorants, it rests in open spaces to spread its wings and dry its feathers. Relatively similar in shape to cormorants, but with a longer tail and a distinctly pointed bill. Occasionally it flies very high.

Gallareta Púrpura

Hermosa ave acuática de pantanos del sureste de Estados Unidos, especialmente de los con mucha vegetación emergente. Cuerpo azul púrpura brillante con espalda verde, cobertoras inferiores de la cola blancas y pico rojo con punta amarilla. Las patas largas amarillas y los enormes dedos les ayudan a caminar sobre los colchones de lirios. Los inmaduros son mayormente beige con las alas olivo pálido. Usualmente se encuentra solo. Vocalizaciones fuertes similares a Common Gallinule.

Nombre científico: Porphyrio martinica
Dimensiones: 30-36 cm

Foto: Jorge Vera

Purple Gallinule

Beautiful aquatic bird from swamps of the southeastern United States, especially those with a lot of emergent vegetation. Bright purple-blue body with green back, white undercoats and red bill with yellow tip. Its long yellow legs and huge toes help them walk on the lily pads. The young ones are mostly beige with pale olive wings. It is usually found alone. Its Strong vocalizations are similar to the Common Gallinule.

Garza Pileada

Esta hermosa garza de tamaño mediano es poco común, pero muy ampliamente distribuida en las tierras bajas de Suramérica, y apenas alcanzando el este de Panamá. Poco probable confundirla; la combinación de la espalda plateada, cuello y vientre beige, gorra negra y lores azules (a veces turquesa brillante) ayudan a distinguirla de otras garzas. También nota las largas p lumas blancas e n la parte posterior d e la cabeza. Ocurre cerca d e pantanos, estanques boscosos y ríos, generalmente anda sola.

Nombre científico: Pilherodius pileatus
Dimensiones: 53-60 cm

Foto: Jorge Vera

Capped Heron

This beautiful medium-sized heron is rare, but very widely distributed in the lowlands of South America, and barely reaching eastern Panama. It is Unlikely to confuse; the combination of the silver back, beige neck and belly, black cap and blue lores (sometimes bright turquoise) help distinguish it from other herons. Also to be noted the long white feathers on the back of the head. Prowls near swamps, wooded ponds, and rivers, generally walks alone.

Gallareta Azulada

Ave de pantano, pequeña y pálida, parecida a una gallina con la región ventral azul-grisáceo lavado que contrasta con su espalda y corona marrón oliva. Toma en cuenta que el pico grueso y la placa frontal son amarillas. Presente en pantanos de agua dulce con abundante vegetación flotante donde su apariencia puede ser estacional y errática. Raramente vista nadando.

Nombre científico: Porphyrio flavirostris
Dimensiones: 23-26cm

Azure Gallinule

Foto: Jorge Vera

Small, pale, hen-like marsh bird with washed blue-gray underparts contrasting with its olive-brown back and crown. Notice that the thick beak and face plate are yellow. It can be found in freshwater swamps with abundant floating vegetation where its appearance can be seasonal and erratic. It is Rarely seen swimming.

Garceta Bueyera

Garza blanca pequeña y compacta, con pico grueso amarillo. Con frecuencia es observada en áreas secas. Con patas rojas o amarillas durante la época reproductiva, negras durante la temporada no reproductiva. Las aves en plumaje reproductivo tienen picos más rojos y parches cremosos en el cuerpo. A menudo se alimenta siguiendo ganado o tractores en zonas agrícolas.

Nombre científico: Bubulcus ibis
Dimensiones: 46-52 cm

Cattle Egret

Foto: Jorge Vera

Small and compact white heron, with thick yellow bill. It is often seen in dry areas. With red or yellow legs during the reproductive season, black during the non-reproductive season. Breeding birds have redder bills and creamy patches on the body. They are often fed by following cattle or tractors in agricultural areas.

Garcilla Cebra

Garza pequeña y oscura del bosque, raramente vista. El plumaje es completamente marrón grisáceo con finas vermiculaciones negras; los juveniles lucen tonos más cálidos. Ocurre a baja densidad en bosques pantanosos, especialmente a lo largo de riberas densamente vegetadas y en áreas con mucha agua estancada. Permanece cerca de la vegetación y busca alimento deliberadamente, camina lentamente por el suelo o embosca a su presa desde perchas bajas, mueve la cola continuamente. Puede congelarse o volar torpemente cuando es asustada. Se escucha más a menudo de lo que se le ve; su llamada es un pitido amortiguado, repetido a intervalos largos, generalmente antes del amanecer o al anochecer. La combinación de tamaño pequeño, plumaje oscuro y hábitat boscoso debería asegurar su identificación.

Nombre científico: Zebrilus undulatus
Dimensiones: 30-33 cm

Zigag Heron

Foto: Grallariatours/Miquel Bonet

Small, dark forest heron, it is rarely seen. Its plumage is completely greyish brown with fine black vermiculations; juvenile ones wear warmer tones. It can be found at low density in swamp forests, especially along densely vegetated riverbanks and in areas with a lot of standing water. It stays close to vegetation and deliberately forages, it walks slowly on the ground or ambushes its prey from low perches. It wags its tail continuously. It May freeze or fly awkwardly when scared. It is heard more often than it is seen; its call is a muffled beep, repeated at long intervals, usually heard before dawn or dusk. The combination of its small size, dark plumage, and wooded habitat should ensure identification.

Garceta Sol

Una de las aves más deslumbrantes de todo el mundo. El intrincado patrón amarillo, rojo y negro en las alas extendidas es verdaderamente de otro mundo. Al estar de pie, más bien parece una garza pero con una postura más horizontal y cola más larga. También busca la cabeza rayada en blanco y negro y la espalda barrada. Encontrado solo o en pares a lo largo de ríos o pantanos, generalmente de pie y en silencio cerca de la orilla. Escucha pors sus silbidos largos en el amanecer y el anochecer.

Sunbittern

Foto: Jesenia Castillo

One of the most dazzling birds in the whole world. Its intricate yellow, red, and black pattern on its outstretched wings is truly otherworldly. When standing, it looks more like a heron but with a more horizontal posture and a longer tail. It has a black and white striped head and a barred back. It is found singly or in pairs along rivers or swamps, usually standing quietly near the shore. It makes long whistles at dawn and dusk.

Ave Sol

Ave nadadora pequeña y reservada de tierras bajas tropicales. No es un Zambullidor, ni le gusta el sol; prefiere arroyos sombreados y corrientes ligeras, manglares, pozas calladas y orillas de lagos. Nada con un ligero movimiento de cabeza y cuando se le molesta sale volando bajo sobre el agua o trepa para percharse en ramas bajas; no bucea. Su cabeza y cuello rayados, así como su pico robusto y puntiagudo son distintivos. La región malar es blanca en el macho y anaranjada en la hembra.

Nombre científico: Heliornis fulica
Dimensiones: 28-38 cm

Sungrebe

Foto: Humberto Castillo

Small and reserved swimming bird of tropical lowlands. It is not a Diver, nor does it like the sun; it prefers shady streams and light streams, mangroves, quiet pools, and lake shores. It swims with a slight movement of the head and when disturbed it flies low over the water or climbs to perch on low branches; it does not dive. Its striped head and neck, as well as its robust, pointed bill are distinctive. The malar region is white in males and orange in females.

Playero Pectoral

Entre los playeros pequeños comúnmente llamados "peep", este es un playero fornido observado más a menudo en pastizales húmedos que en arena o agua. La combinación del tamaño más grande, patas amarillentas y base del pico de color pardo es generalmente suficiente para separarlo de otros playeros. También observa el estriado denso del pecho con un borde abrupto en el vientre blanco. Partes superiores marrones con tintes rojizos. Plumaje y patas amarillas similares a las de Least Sandpiper pero Pectoral es mucho más grande. Los machos tienen un gran saco aéreo en la garganta que inflan durante el despliegueuele

Nombre científico: Calidris melanotos
Dimensiones: 20-23 cm

Foto: Diana Gisselle Ante

Spotted Sadpiper

Among the small shorebirds commonly called "peep", this is a stocky sandpiper seen more often in wet grasslands than in sand or water. The combination of their larger size, yellowish legs, and brownish base of its bill is generally sufficient to separate it from other shorebirds. It has a dense striatum on the chest with a sharp edge on the white belly. It has Brown upper parts with reddish tints. It has a Yellow plumage and its legs are similar to Least Sandpiper but its Pectoral is much larger. Males have a large air sac in the throat that they inflate during deployment

Chorlo Collarejo

Chorlo pequeño y poco común en playas, lagunas costeras, barras de arena, orillas de lagos y playones ribereños. Note el pico fino negro, patrón brillante de la cabeza, banda negra estrecha en el pecho y patas rosadas largas. A pesar de su nombre, no tiene un collar blanco completo en la nuca como la mayoría de los chorlos pequeños. Típicamente se le encuentra en parejas o aves solas, no en parvadas como otros chorlos. Durante las mareas altas suelen perchar junto a otros chorlos como Wilson's y Semipalmated.

Nombre científico: Charadrius collaris
Dimensiones: 14-15 cm

Collared Plover

Small and rare plover on beaches, coastal lagoons, sand bars, lake shores and riparian beaches. It has a black bill, shiny head pattern, narrow black chest band, and long pink legs. Despite its name, it does not have a full white collar on the nape like most small plovers. It is typically found in pairs or single, and not in flocks like other plovers. During high tides they usually perch alongside other plovers such as Wilson's and Semipalmated

Foto: Carlos Landazuri

Rayador Negro

Ave extraña parecida a un gaviotín con un pico extremadamente grande, y con la mandíbula inferior mucho más grande que la mandíbula superior. Forrajea volando cerca de la superficie del agua y sumergiendo su mandíbula inferior en el agua, buscando peces pequeños. Se encuentra en zonas costeras, especialmente playas y bancos de arena. Las bandadas en vuelo a veces emiten llamadas que suenan como “yip”.

Nombre científico: Rynchops niger
Dimensiones: 42-46 cm

Blak Skimmer

Foto: Jorge Vera

Strange tern-like bird with an extremely large beak, and with a lower jaw much larger than its upper jaw. It forages by flying close to the surface of the water and dipping its lower jaw into the water, searching for small fish. It is found in coastal areas, especially beaches and sandbanks. Flocks in flight sometimes its calls sound like "yip."

Patiamarillo Menor

Ave playera de tamaño mediano con patas amarillo-brillantes. El plumaje es básicamente idéntico a Greater Yellowlegs, tiene la parte dorsal gris con manchas blancas y vientre blanco. Las proporciones son más útiles para separar ambas especies: el pico es sólo un poco más largo que la cabeza y recto, más pequeña que Greater Yellowlegs, con cuello más corto, cabeza redondeada y de aspecto más lindo. Vea también: Greater Yellowlegs.

Nombre científico: Tringa flavipes
Dimensiones: 26 – 30cm

Foto: Jaime Gavidia

Lesser Yellowlegs

Medium-sized shorebird with bright-yellow legs. Its plumage is basically identical to the Greater Yellowlegs, it has a gray upperpart with white spots and a white belly. Its proportions are more useful to differentiate the two species: its beak is only slightly longer than its head, smaller than Greater Yellowlegs, it has a shorter neck, rounded head, and cuter looking. See also: Greater Yellowlegs.

Chorlo Pinto

Ave playera contrastantemente coloreada de ríos tropicales de tierras bajas. Su plumaje blanco y negro es distintivo y resalta contra sus alas grises y patas anaranjadas. Típicamente se alimenta solo o en pares a lo largo de las costas y playas de ríos.

Nombre científico: Vanellus cayanus
Dimensiones: 21-24cm

Foto: Jesenia Castillo

Pied Lapwing

Contrastingly colored shorebird of tropical lowland rivers. Its black and white plumage is distinctive and stands out against its gray wings and orange legs. It typically feeds singly or in pairs along river coasts and beaches.

Chorlitejo Semipalmeado

Ave playera pequeña; más pequeña que un Killdeer. Café por arriba y blanco por abajo, con una sola banda negra en el pecho. Pico corto con base naranja y punta negra. A menudo parece rechoncho y sin cuello. Se alimenta en lodazales y playas, usualmente mezclado con otras aves playeras. Incluso cuando están en una bandada, los individuos están típicamente separados, no todos cercanos como en otras aves playeras.

Nombre científico: Charadrius semipalmatus
Dimensiones: 17-19 cm

Semipalmated Plover

Foto: Jaime Gavidia

Small shorebird; smaller than a Killdeer. It is Brown at the top and white at the bottom, it has a single black band across the chest. It has a Short bill with orange base and black tip. Often appears plump and neckless. Feeds in mud flats and beaches, usually mixed with other shorebirds. Even when in a flock, the individuals are typically separated, not all close as in other shorebirds.



Andarríos coleados

Ave playera pequeña. Constantemente balancea la cola mientras camina en los bordes de riachuelos, estanques y lagos en busca de invertebrados. Varios individuos pueden ser encontrados en el mismo cuerpo de agua, pero nunca forman grupos compactos.
En verano tienen las partes inferiores manchadas y en invierno su plumaje es relativamente simple. Escuche por las llamadas, son silbidos de dos o tres notas y los emiten cuando alzan vuelo a las orillas de los cuerpos de agua. Con movimientos distintivos de las alas: rápidos y por debajo de la línea horizontal.

Nombre científico: Actitis macularia
Dimensiones: 18-20cm

Spotted Sandpiper

Foto: Jesenia Castillo

It is a tiny shorebird. It constantly swings its tail as it walks along the edges of streams, ponds, and lakes in search of invertebrates. Several individuals can be found in the same body of water, but they never form compact groups. In summer, their underparts are spotted and in winter their plumage is relatively simple. Listen to its call, they are whistles of two or three notes and they emit them when they take flight to the shores of the bodies of water. With distinctive wing movements: fast and below the horizontal line.

Gaviotín Picudo

Inconfundible gaviotín grande y ruidoso, con un largo y grueso pico amarillo, corona negra, alas tritonales (primarias negras, secundarias pálidas y cobijas superiores grises) y cola gris. Los juveniles tienen corona y alas más marrones. Presente a lo largo de grandes ríos y lagos.

Nombre científico: Phaetusa simplex
Dimensiones: 38-40 cm

Large-billed Tern

Foto: Jorge Vera

Unmistakable large, noisy tern, with a long, thick yellow bill, black crown, tritonal wings (black primaries, pale secondaries, and gray upper blankets), and gray tail. Juveniles ones have more brownish crown and wings. It is present along large rivers and lakes.

Arasari Orejicastaño

Tucán de tamaño medio del bosque lluvioso tropical. Se distingue de otros aracaris por un parche azul de piel desnuda alrededor del ojo claro y una única banda roja en su vientre amarillo. Prefiere bordes de bosque y bosque joven; a menudo se encuentra cerca de jardines y asentamientos humanos Se encuentra con frecuencia en pares o grupos pequeños, especialmente en árboles con frutos.

Nombre científico: Pteroglossus castanotis
Dimensiones: 43-46 cm

Foto: Jorge Vera

Chestnut-eared Aracari

Medium-sized toucan from the tropical rain forest. It is distinguished from other aracaris by a blue patch of bare skin around the light eye and a single red band on its yellow belly. It Prefers forest edges and young forest; it is often found near gardens and human settlements. It is frequently found in pairs or small groups, especially on bearing trees.

Tucancillo Collaridorado

Tucán atractivo con un pico grueso del bosque lluvioso de tierras bajas. Los machos son negros arriba, marrones abajo, con un parche amarillo que se extiende a través del ojo; las hembras son similares pero son rojo-marrón arriba. Típicamente se encuentra en las alturas del bosque lluvioso maduro, pero ocasionalmente se encuentra cerca de los bordes del bosque y en las llanuras del bosque lluvioso. Escucha por su distintiva llamada, un gruñido gutural "grruk" repetido.

Nombre científico: Selenidera reinwardtii
Dimensiones: 30-32 cm

Golden- collared Toucanet

Foto: Josue Chavez

Attractive toucan with a thick bill from the lowland rain forest. Males are black above, brown below, with a yellow patch that extends across the eye; females are similar but are red-brown on top. They are typically found high in mature rainforest, but occasionally near forest edges and on rainforest plains. It has a distinctive call, a repeated guttural "grruk" growl.

Tucán Goliblanco

Tucán grande, blanco y negro, de bosques de tierras bajas. A menudo se percha conspicuamente en las copas de los árboles y en los claros. Su distribución traslapa con la de Channel-billed Toucan, que es notablemente similar en la mayor parte de su rango. White-throated Toucan es un poco más grande y con el pico más largo que Channel-billed Toucan, pero se identifica más fácilmente por su vocalización

Nombre científico: Ramphastos tucanus
Dimensiones: 53-57 cm

White -Throated Toucan

Foto: Jorge Vera

Large black and white toucan from lowland forests. It often perches conspicuously in treetops and clearings. Its distribution overlaps with the one of the Channel-billed Toucan, which is remarkably similar throughout most of its range. The White-throated Toucan is slightly larger and longer-billed than Channel-billed Toucan, but it is more easily identified by its vocalization



Carpintero Lineado

Carpintero tipo "pájaro loco" de bosques tropicales y faldas de montañas. También se le encuentra en áreas semiabiertas con árboles altos, manglares y otros hábitats arbolados. Su cresta copetona roja y la cara negra lo distinguen del Pale-billed Woodpecker adulto, el cual suele estar presente en las mismas áreas. Note también que las líneas blancas de la espalda del Lineated Woodpecker están más espaciadas, a diferencia del Pale-billed Woodpecker. Su llamado como risa suena como un Carpintero de Pechera, y muy distinto al del Pale-billed Woodpecker.

Lineated Woodpecker

It is a Woodpecker type of tropical forests and foothills. It is also found in semi-open areas with tall trees, mangroves, and other wooded habitats. Its red tufted crest and black face distinguish it from the adult Pale-billed Woodpecker, which is usually found in the same areas. Note that the white lines on the back of the Lineated Woodpecker are more widely spaced, unlike the Pale-billed Woodpecker.

Nombre científico: Dryocopus lineatus
Dimensiones: 33-35cm

Foto: Jorge Vera

Carpintero Barbinegro

Gran pájaro carpintero pelirrojo, ampliamente distribuido desde Panamá hasta Paraguay. Se encuentra en bosques y bordes de las tierras bajas, a menudo perchado visiblemente en lo alto sobre un tocón o un árbol grande. Tiende a ser visto en hábitats abiertos en comparación con Red-necked Woodpecker, pero hay un significativo traslape. El macho es distintivo con las partes inferiores barradas y la cabeza casi completamente de color rojo con un parche blanco y negro en la mejilla. La hembra se distingue de otros pájaros carpinteros grandes (como Lineated) por una franja blanca muy ancha en la cara y una V blanca en la espalda. Escucha por fuertes golpes dobles y parloteos.

Nombre científico: Campephilus melanoleucos

Dimensiones: 33-35cm

Crimson-crested Woodpecker

Large red-haired woodpecker, widely distributed from Panama to Paraguay. It is found in forests and lowland edges, often perched conspicuously high on a stump or large tree. It tends to be seen in open habitats compared to Red-necked Woodpecker, but there is significant overlap. The Male is distinctive with barred underparts and almost entirely red head with a black and white cheek patch. The female is distinguished from other large woodpeckers (such as Lineated) by a very wide white stripe on the face and a white V on the back. It has a loud double hits and chatter.

Foto: Josue Chavez

Carpintero Castaño

Un "clásico" carpintero del género Celeus; de tamaño medio, en general rufo y con cresta enmarañada. A diferencia del similar Scale-breasted Woodpecker (Celeus grammicus) y de Waved Woodpecker (Celeus undatus), Chestnut Woodpecker (Celeus elegans) carece, mayormente o en su totalidad, de marcas negras en el cuerpo y en las alas. Ambos sexos son similares, pero los machos tienen bigotera roja.

Chesnut- headed Woodpecker

A "classic" woodpecker of the genus Celeus; medium in size, generally rufous and with a tangled crest. Unlike the similar Scale-breasted Woodpecker (Celeus grammicus) and Waved Woodpecker (Celeus undatus), Chestnut Woodpecker (Celeus elegans) it lacks, mostly or entirely, of black markings on the body and wings. Both sexes are similar, but males have a red mustache.

Nombre científico: Celeus elegans
Dimensiones: 26-28 cm

Foto: Josue Chavez

Trepatroncos Piquilargo

Trepatroncos grande e inconfundible, bastante extendido en gran parte de la Amazonía. tiene un largo pico rosáceo, garganta blanca, y un característico rayado blanco en el cuello y en el pecho. Normalmente se lo encuentra solo o en parejas en los niveles medios y en el dosel del bosque de tierras bajas y en bordes de bosque, frecuentemente cerca del agua. Usualmente es hallado por su canto; presta atención a una serie de silbidos largos y llanos, producidos a menudo al amanecer o al atardecer.

Nombre científico: Nasica longirostris
Dimensiones: 23-24 cm

Long-billed Woodcreeper

Foto: Jorge Vera

Large and unmistakable Nuthatch, quite widespread in much of the Amazon. It has a long pinkish bill, a white throat, and a characteristic white streaking on the neck and chest. Usually found singly or in pairs in the middle levels and in the lowland forest canopy and at forest edges, often near water. It is usually found by its song; pay attention to a series of long, flat whistles, often produced at dawn or dusk.

Carpintero Amarillo

Característico carpintero amarillo de tierras bajas amazónicas. En general es amarillo cremoso brillante con corta cresta color crema, alas y cola marrones y pico amarillo; los machos tienen bigotera roja. Generalmente encontrado en áreas estacionalmente inundables y áreas boscosas y pantanosas, sin embargo, puede ser encontrado fuera de esos hábitats ocasionalmente en otras zonas boscosas. Pon atención a su llamado: una serie de silbidos fuertes y descendentes: "PII-pii-pii-piir".

Cream-coloured Wooppeker

Yellow woodpecker from the Amazonian lowlands. It is generally bright creamy yellow with short cream crest, brown wings and tail, and yellow bill; males have red mustaches. It is mostly found in seasonally flooded areas and forested and swampy areas, however, it can occasionally be found outside of those habitats in other forested areas. Heed their call: a series of loud, descending whistles: "Pii-pii-pii-piir."

Foto: Jorge Vera

Nombre científico: Celeus flavus
Dimensiones: 25-27 cm

Carpintero Pechipunteado

Pájaro carpintero mediano y atractivo, mayormente de color dorado oliva con puntos negros contrastantes en el cuerpo y las alas. Patrón de la cara llamativo con nuca roja, frente negra, mejilla blanca y garganta a cuadros. Los machos también muestran bigote rojo; por lo demás ambos sexos similares. Ampliamente distribuido pero generalmente poco común; se encuentra en una variedad de hábitats boscosos abiertos y bordes, incluyendo bosques secundarios y jardines.

Nombre científico: Colaptes punctigula
Dimensiones: 20-21 cm

Foto: Jorge Vera

Sopt-breasted Woodpecker

It is an Eye-catching medium-sized woodpecker, mostly olive-gold in color with contrasting black spots on its body and wings. It has a Striking face pattern with red nape, black forehead, white cheek, and plaid throat. Males also show a red mustache; otherwise both sexes similar. Widely distributed but generally rare; It is found in a variety of open and edged woodland habitats, including secondary forests and gardens.

Foto: Jorge Vera

Foto: Jorge Vera

Carpintero Azulado

Pájaro carpintero escandaloso y colorido de los bosques de tierras bajas. Su contrastante coloración negra y amarilla es distintiva. Frecuentemente se percha en tocones altos en el bosque maduro y el bosque secundario. Altamente social, a menudo se ve en grupos, especialmente cerca de colonias de anidación.

Nombre científico: Melanerpes cruentatus
Dimensiones: 18-19 cm

Yellow-tufted Woodpecker

Scandalous and colorful woodpecker from the lowland forests. Its contrasting black and yellow coloration is distinctive. It frequently rests on tall stumps in mature forest and secondary forest. Highly social, often seen in groups, especially near nesting colonies.

Foto: Jorge Vera

Carpintero Fajeado

Este sorprendente carpintero del género Celeus se extiende por las tierras bajas amazónicas del norte de Sudamérica, con una población disyunta en el sureste de Brasil. En general es rufo con una cresta enmarañada como la mayoría de los otros miembros del género. Característico y difícil de confundirlo. Existe cierta variación a lo largo de su rango de distribución: la mayoría de individuos tienen extensas marcas negras en la región dorsal y el vientre, sin embargo en gran parte del noreste los individuos carecen de ellas. Todos los individuos tienen el pecho negro sólido. Ambos sexos son similares pero los machos tienen una bigotera roja. Está presente en bosque maduro y en bordes de bosque, frecuentemente hallado por su serie de silbidos fuertes y estridentes

Nombre científico: Celeus torquatus
Dimensiones: 26-28 cm

Ringed Woodpevker

Foto: Alex Boas

This surprising woodpecker of the genus Celeus spans the Amazonian lowlands of northern South America, with a disparate population in southeastern Brazil. It is generally rufous with a tangled crest like most other members of the genus. It is very particular and difficult to mistake. There is some variation throughout their range: most individuals have extensive black markings on the dorsal region and belly, however in much of the northeast individuals lack them. All individuals have solid black chests. Both sexes are similar but males have a red mustache. It is present in mature forest and forest edges, frequently found for its series of loud and shrill whistles.

Urraca Violácea

Ave grande y oscura con un plumaje azul vibrante y una cabeza y un babero negros. Frecuenta una variedad de hábitats abiertos, incluyendo bordes de bosques, jardines y áreas agrícolas. A menudo es particularmente común en la vegetación a lo largo de ríos y caminos acuáticos. Se distingue de la similar Purplish Jay por su brillante plumaje azul y su contraste nuca pálida. También escucha por un penetrante y agudo "jiir".

Nombre científico: Cyanocorax violaceus

Dimensiones: 35-37cm

Violaceous Jay

Foto: Jorge Vera

Large, dark bird with vibrant blue plumage and a black head and bib. It frequents a variety of open habitats, including forest edges, gardens, and agricultural areas. It is often particularly common in vegetation along rivers and waterways. It is distinguished from the similar Purplish Jay by its bright blue plumage and its contrasting pale nape. Listen to an intense, high-pitched "jiir."

Cuco Ardilla

Cuclillo rojo canela brillante y llamativo con cola larga, ampliamente distribuido en tierras bajas tropicales; localmente en faldas de montañas. No hay especies similares en México y Centroamérica. Se le encuentra en gran variedad de hábitats arbolados y bordes de bosque. Generalmente se alimenta sigilosamente en los estratos medios y altos de los árboles, donde puede ser sorprendentemente difícil de ver. Puede encontrarse atravesando en picada los caminos, causando sorpresa. La parte inferior de las plumas de la cola, que tienen puntas blancas.

Nombre científico: Piaya cayana
Dimensiones: 40-46 cm

Squirrel Cuckoo

Foto: Jorge Vera

Bright and striking cinnamon-red cuckoo with long tail, widely distributed in tropical lowlands; locally on mountain slopes. There are no similar species in Mexico and Central America. It is found in a wide variety of wooded habitats and forest edges. It generally forages stealthily in the middle and upper strata of trees, where it can be surprisingly difficult to see. It can be found swooping down the roads, causing surprise. The underside of its tail feathers, have white tips.

Garrapatero Menor

Los garrapateros son cucús muy raros color negro carbón, con colas largas flexibles y picos únicos muy profundos con las caras laterales muy amplias. Se encuentran en tierras bajas tropicales y laderas en una gran variedad de hábitats abiertos y semiabiertos. Groove-billed Ani es muy parecido a Smooth-billed En la mayoría de los lugares solo se encuentra una especie, pero ambas se encuentran entre Nicaragua y Venezuela. Smooth-billed es ligeramente más grande con los lados del pico lisos

Nombre científico: Crotophaga ani
Dimensiones: 33-36 cm

Smooth-billet Ani

Ticks are very rare coal-black cuckoos, with long flexible tails and very deep single beaks with very broad lateral faces. They are found in tropical lowlands and slopes in a wide variety of open and semi-open habitats. Groove-billed Ani is very similar to Smooth-billed. Only one species is found in most places, but both of them are found between Nicaragua and Venezuela. Smooth-billed is slightly larger with smooth bill sides

Foto: Jorge Vera

Garrapatero Mayor

Los anis son extraños cucos negros con colas largas flexibles y picos únicos: muy profundo y de lados amplios. Greater es el ani más grande, distintivo con su ojo penetrante y amarillo, y tonos brillantes de azul, verde y púrpura en las alas y la cola. Siempre asociado con agua; especialmente tiende a ser encontrado bajo en el borde del bosque cerca de lagos y ríos de movimiento lento. Visto en grupos familiares. Ampliamente distribuido en tierras bajas desde Panamá hasta Argentina.

Nombre científico: Crotophaga major
Dimensiones: 46-48 cm

Greater ani

Foto: Jorge Vera

The Anis are strange black cuckoos with long flexible tails and unique beaks - very deep and wide-sided. Greater is the largest ani, it is distinctive with its piercing yellow eye, and bright shades of blue, green, and purple on its wings and tail. Always associated with water; it especially tends to be found low on the edge of the forest near slow-moving lakes and rivers. Seen in family groups. Widely distributed in lowlands from Panama to Argentina.



Elanio Tijereta

Rapaz de alas largas, estrechas y puntiagudas que le ayudan a maniobrar para atrapar insectos en vuelo. Principalmente gris con cabeza blancuzca, secundarias blancas en la parte superior del ala y cola negra. Graciosa en vuelo con aleteos fluidos y largos deslizamientos. Prefiere bosques riparios; ocasionalmente ocurre cerca de humanos en áreas suburbanas. Construye nidos de palos en la parte superior de los árboles. Pasa el invierno en Suramérica.

Nombre científico: Ictinia mississippiensis
Dimensiones: 56-61cm

Swallow- tailed Kite

Raptor with long, narrow and pointed wings that help it maneuver to catch insects in flight. It is mainly gray with a whitish head, white secondaries on upper wing and a black tail. It is graceful in flight with fluid wingbeats and long glides. Prefers riparian forests; occasionally occurs near humans in suburban areas. It builds stick nests on top of trees. It winters in South America.

Halcón Reidor

Espectacular y distinguida ave rapaz de las tierras tropicales a baja altura; suele verse posado sobre trocos desnudos, desde donde caza serpientes. Habita en el bosque y también en los campos con árboles dispersos. Nota que su cabeza y sus partes de abajo son color crema, y tiene una “mascara de bandido” negra y grande. No planea. Vuela con prisa y aleteos tensos, exponiendo sus manchas color cobre bajo las alas. Su llamado parece una carcajada a lo lejos.

Nombre científico: Herpetotheres cachinnans
Dimensiones: 46-52 cm

Laughing Falcon

Spectacular and distinguished bird of prey from the tropical lands at low altitude; It is usually seen resting on naked trails, from where it hunts snakes. It lives in the forest and also in fields with scattered trees. Note that his head and underparts are cream colored, and it has a large black "bandit mask". It does not plan. It flies in a hurry and tense wingbeats, exposing its copper-colored spots under its wings. Its call is like a laugh in the distance.



Gavilán Campestre

Suele verse en cables, postes y cercas. El adulto tiene ojos pálidos penetrantes, pecho estriado que contrasta con el vientre barrado. El inmaduro es estriado en las partes inferiores, muy similar a otras aguilillas inmaduras, pero su cola tiene bandas muy anchas y parejas. Vuela con aleteos rápidos y fuertes.

Roadside Hawk

Often seen on cables, posts, and fences. Adults have piercing pale eyes on, striated chest that contrasts with barred belly. At a young age, it is striated on the undersides, very similar to other immature hawks, but its tail has very wide and even bands. It flies with fast and strong wingbeats.

Nombre científico: Rupornis magnirostris
Dimensiones: 33-38 cm

Foto: Jorge Vera

Elanio Caracolero

Ave rapaz que come caracoles. Ampliamente distribuido y relativamente común en Centroamérica y Suramérica, pero con un rango muy restringido en Estados Unidos. Se encuentra exclusivamente alrededor de lagos y pantanos con abundante vegetación. El macho adulto es completamente gris oscuro con los ojos rojos, los pies y el pico anaranjado (brevemente rojos en periodo reproductivo). Las hembras y los inmaduros son marrones rayados. Observe el pico muy ganchudo, las alas anchas y largas, la cola corta oscura con una base blanca arriba y abajo. A menudo se ven parejas o grupos pequeños volando sobre pantanos con aleteos lentos y relajados. Frecuentemente se percha sobre los arbustos

Nombre científico: Rostrhamus sociabilis
Dimensiones: 40-45cm

Snail kite

Foto: Jorge Vera

It is a Bird of prey that eats snails. Widely distributed and relatively common in Central and South America, but with a very restricted range in the United States. It is found exclusively around lakes and swamps with abundant vegetation. The adult male is completely dark gray with red eyes, feet and orange bill (briefly red in reproductive period). Females and juveniles are striped brown. Notice their very hooked beak, long wide wings, and short dark tail with a white base at the top and at the bottom. Pairs or small groups are often seen flying over swamps with slow, relaxed wingbeats. They often perches in bushes

Gavilán Pizarroso

Gavilán rechoncho, gris pizarra, con alas anchas y bandas blancas en la cola; tiene piel facial, pico y patas rojo brillante. Cercanamente asociado con agua, se encuentra más frecuentemente solo o en pares perchado cerca de lagos de herradura, arroyos boscosos, bosques inundados y bosques de llanuras aluviales.

Foto: Jorge Vera

Slate coloured Hawk

Chubby hawk, slate gray, with wide wings and white bands on the tail; it has bright red facial skin, bill and legs. It is closely associated with water, it is most frequently found singly or in pairs perched near horseshoe lakes, wooded streams, flooded forests, and floodplain forests.

Águila Canela

Aguililla fornida y atractiva de marismas y humedales. Suele verse perchada y quieta cerca del agua, esperando el momento de lanzarse para atrapar peces o ranas. El adulto es distintivo, con la mayor parte de su plumaje naranja y la cabeza blanca (su collar negro es difícil de ver a veces). El inmaduro es parduzco, más opaco que el adulto, pero con un patrón similar. Note las patas y dedos rosa pálido y opaco (amarillas o naranja en casi todas las aguilillas). En vuelo sus alas se ven muy anchas y la cola muy corta.

Nombre científico: Busarellus nigricollis
Dimensiones: 46-56 cm

Foto: Jorge Vera

Black-collared Hawk

Chunky and attractive hawk from marshes and wetlands. It is usually seen perched and still near the water, waiting for the moment to launch itself to catch fish or frogs. The adult bird is distinctive, with most of its plumage orange and a white head (its black collar is difficult to see at times). The fledgling one is brownish, more opaque than the adult, but with a similar pattern. It has dull pale pink feet and toes (yellow or orange on most hawks). In flight its wings are very wide and its tail is very short.

Elanio Piquigarfio

Rapaz oscura, mediana, con una forma distintiva. El plumaje en la adultez es completamente gris pizarroso con patas rojas; el de los juveniles es similar, pero muestra un pálido barreteado en la región ventral y en la cola. Toma en cuenta el contraste entre los ojos amarillos y el pico excepcionalmente largo y curvado hacia abajo; en vuelo, muestra una cola muy corta, alas anchas y ausencia completa de blanco en el plumaje. Habita en bosques pantanosos, donde se posa silenciosamente en niveles bajos y medios, en busca de caracoles. Planea con frecuencia, pero rara vez alto o por mucho tiempo (pon atención a su distintivo perfil de vuelo). Su llamado está compuesto de solamente una nota explosiva, en tono descendente y con calidad quejumbrosa.

Nombre científico: Helicolestes hamatus
Dimensiones: 37-41cm

Slender-billed Kite

Foto: Alex Boas

Dark, medium raptor with a distinctive shape. The plumage in adulthood is completely slate gray with red legs; that of juveniles is similar, but shows a pale barreled on the ventral region and on the tail. Take into account the contrast between the yellow eyes and the exceptionally long, downward-curved bill; in flight, it shows a very short tail, wide wings and a complete absence of white in the plumage. It inhabits swampy forests, where it perches silently at low and medium levels, in search of snails. It glides frequently, but rarely high or for long (pay attention to its distinctive flight profile). His call is composed of only one explosive note, descending in tone and with a plaintive quality.

Elanio Cabecigrís

Halcón escaso de bosques tropicales húmedos de tierras bajas. Se percha principalmente en el dosel, dando llamados largos como risas de vez en cuando. En vuelo, sus aleteos son sueltos y flexibles. Al planear, mantiene las alas elevadas. El adulto es distintivo, cabeza gris suave, ojos obscuros (sin amarillo en la cara, a diferencia de muchos halcones) y patas grises relativamente pequeñas. El inmaduro tiene dos tipos de plumajes, ambos con dos o tres bandas gris claro en la cola. El primer tipo tiene cabeza y partes superiores café obscuro con partes inferiores blancuzcas con barrado obscuro; el segundo tiene cabeza y partes superiores blancas con una pequeña corona negra.

Leptodon cayanensis

Dimensiones: 45-58

Foto: Vilma Lucero

Grey-headed Kite

Rare hawk of humid tropical lowland forests. It perches mainly in the canopy, giving long calls like giggles from time to time. In flight, their wingbeats are loose and flexible. When gliding, it keeps its wings high. The adult ones are particular, they have a smooth gray head, dark eyes (no yellow on the face, unlike many hawks), and a relatively small gray legs. The fledging has two types of plumage, both with two or three light gray bands on the tail. The first type has dark brown head as well as dark brown upper parts with whitish underparts with dark bars; the second one has both head and upper parts white, with a small black crown.

Elanio Perla

Rapaz muy pequeña encontrada en espacios abiertos, a menudo perchado en un cable de teléfono o árbol expuesto. Únicamente el tamaño ayuda con la identificación. Incluso es más pequeño que un cernícalo, con las partes inferiores blancas y la espalda gris. También busca la frente y mejilla beige y los flancos ferruginosos. Ambos sexos son iguales. Usualmente visto solo cerca de campos abiertos

Nombre científico: Gampsonyx swainsonii
Dimensiones: 22-28 cm

Pearl Kite

Foto: Carlos Landazuri

Very small raptor found in open spaces, often perched on a telephone wire or exposed tree. Also size helps with identification. It is even smaller than a kestrel, with white underparts and gray back. Also look for the beige forehead and cheek and the rusty flanks. Both sexes are the same. Usually seen only near open fields

Águila Harpía

Primer registro de una familia de águila harpia en la Reserva Biológica Limoncocha, es el ave rapaz más enorme, restringida al bosque maduro e inundado y siempre rara. Con enormes garras. El adulto es gris oscuro arriba, más pálido abajo, con una banda oscura obvia en el pecho. En vuelo, observa el barrado blanco y negro más obvio en las alas para ayudarte a separarla de Crested Eagle. El juvenil tiene la cabeza más blanca que el adulto y ninguna banda en el pecho; Se alimenta de monos y perezosos. Realiza su nido en los grandes árboles como los ceibos, normalmente se ve perchado en el dosel o volando a través del bosque o río, no vuela alto.

Nombre científico: Harpia harpyja
Dimensiones: 110-125 cm

La Madre y Padre Águila Harpía

Foto: Humberto Castillo

El Polluelo en sus primeros saltos en el nido aprendiendo a volar

Harpy Eagle

Foto: Emilio Filbig

First record of a harpy eagle family in the Limoncocha Biological Reserve, it is the largest bird of prey, and it is restricted to mature and flooded forests and it is always rare. It has huge claws. The adult bird is dark gray at the top, and paler at the bottom, with a dark band on its chest. In flight, it has a black and white baring on the wings to help separate it from the Crested Eagle. The juvenile bird has a white head and no chest band; it feeds on monkeys and sloths. It makes its nest in large trees such as ceibos, it is usually seen perched in the canopy or flying through the forest or river, it does not fly high.

ÁGUILA HARPÍA

Harpia harpyja

POLLO DE LIMONCOCHA

Tamaño, peso y alimentación

MADRE
Peso: 9 kg
Altura: 105 cm

PADRE
Peso: 4.8 kg
Altura: 96 cm

2mts. de Tamaño

ALIMENTACIÓN
Monos, Perezosos, Cuchuchos
Serpientes, Aves

Reproducción

Árboles: Ceibos o Samanes
Hembra y macho elaboran el nido
En Ecuador pueden criar a lo largo de todo el año

Amenazas

Caza & trafico de fauna

Perdida de hábitat

Monitoreo

El pollo esta siendo monitoreado mediante un GPS incorporado.

Garras

Sus garras son consideradas las más fuertes entre todas las águilas.

Distribución

Reserva Biológica Limoncocha

FOTOGRAFÍAS
Jorge Vera, Jesenia Castillo, Humberto Castillo, César Galan, Carlos Landazuri, Emilio Filbig

AUTOR
Marco Dänzer

Tangara Palmera

Tangara grande y uniforme. Mayormente gris, pero en buena luz se observan las tonalidades verde oliva; nota las alas negras contrastantes con un parche más pálido en la base de las primarias. Un generalista de hábitat, se encuentra en una variedad de áreas abiertas con arbustos, jardines o bordes de bosques. Usualmente en parejas o pequeñas bandadas, a veces mezclados con otras especies. A menudo bastante ruidoso y conspicuo, emite una serie de chirridos o una sola llamada nasal "swii".

Nombre científico: Thraupis palmarum
Dimensiones: 16-17 cm

Palm Tanager

Large, uniform tanager. Mostly gray, but in good light the olive green tones can be observed; note the contrasting black wings with a paler patch at the base of the primaries. A habitat generalist, it is found in a variety of open areas with shrubs, gardens, or forest edges. It is usually found in pairs or small flocks, sometimes mixed with other species. They are often quite loud and conspicuous, it emits a series of squeaks or a single nasal call "swii".

Foto: Jorge Vera

Tangara Azulejo

Ave gris azulosa clara, común y de amplia distribución en campos abiertos con árboles grandes y setos vivos, también en pueblos, villas, y jardines en regiones tropicales y subtropicales. Suele alimentarse de frutas en la parte alta y media de los árboles. Se percha en los cables de teléfono. Sencillo, pero de aspecto distintivo, con ojos oscuros y un pico robusto. La población al este de los Andes en América del Sur tiene barras blancas anchas en las alas, y se ven muy diferentes.

Nombre científico: Thraupis episcopus
Dimensiones: 15-17 cm

Blue-grey Tanager

Foto: Carlos Landazuri

Light blue-gray bird, common and widely distributed in open fields with large trees and living hedges, also in towns, villages, and gardens in tropical and subtropical regions. It usually feeds on fruits in the upper and middle part of the trees. It perches on telephone cables. Simple, but distinctive looking, with dark eyes and a robust bill. The population east of the Andes in South America have wide white wing bars, and they look very different.

Tangara Urraca

Inconfundible tangara enorme, blanco y negro, con una cola muy larga, la rabadilla y el vientre blancos. Nota los ojos amarillos que contrastan con la cabeza, la espalda, el pecho y las alas negro-azul brillante. La cola graduada es negra y tiene puntas blancas. Se encuentra en los bordes del bosque, plantaciones, claros y jardines; ocasionalmente se une a bandadas de especies mixtas

Nombre científico: Cissopis leverianus
Dimensiones: 25-27 cm

Magpie tanager

Foto: Jorge Vera

Unmistakable huge black and white tanager, with a very long tail, white rump and belly. Note their yellow eyes that contrast with the bright black-blue head, back, chest, and wings. Its graduated tail is black and has white tips. It can be found on the edges of woods, plantations, clearings, and gardens; it occasionally joins mixed species flocks

Tangara Enmascarada

Tangara pequeña y atractiva; carmesí brillante y negro con una máscara negra y pico plateado. Se encuentra más comúnmente en la vegetación cerca de los lagos en herradura, también a veces se encuentra en bosques cercanos y a lo largo de ríos. Los sexos son similares, aunque las hembras son ligeramente más opacas que los machos. La cantidad de carmesí y la máscara negra distinguen fácilmente a esta especie de otras tangaras dentro de su rango.

Nombre científico: Ramphocelus nigrogularis
Dimensiones: 18-19 cm

Masked Crimson Tanagar

Foto: Jorge Vera

Small and attractive tanager; bright crimson and black with a black mask and silver beak. It is most commonly found in vegetation near horseshoe lakes, it is also sometimes found in nearby forests and along rivers. Both sexes are similar, although the females are slightly duller than the males. Its crimson color and its black mask makes it easy to distinguish this species from other tanagers within its range.

Cotinga Mayna

Cotinga azul brillante del bosque lluvioso de tierras bajas. Los machos son azul cielo, con la garganta púrpura y ojos claros; las hembras son marrón claro con un festoneado tenue. Se percha en el dosel del bosque, y a veces puede ser más fácil encontrarlos cuando se tiene una vista clara del dosel, como desde una torre de dosel, cerca de los bordes de un claro del bosque, o desde un acantilado con vista al dosel. Los machos se distinguen de Spangled Cotinga por su plumaje azul más profundo, la ausencia de rayas finas oscuras en la cabeza y el ojo amarillo claro; las hembras son marrón más cálido que las hembras de Spangled Cotinga, que son de un gris opaco, y a menudo tienen un ojo pálido como el macho.

Nombre científico: Cotinga maynana
Dimensiones: 19-20 cm

Foto: Jorge Vera

Plum-throated Cotinga

Bright blue cotinga from the lowland rain forest. Males are light blue, with purple throats and light eyes; females are light brown with faint scalloping. They perch in the forest canopy, and can sometimes be easier to find when you have a clear view of the canopy, such as from a canopy tower, near the edges of a forest clearing, or from a cliff overlooking the canopy. Males are distinguished from Spangled Cotinga by their deeper blue plumage, the absence of fine dark stripes on their head, and the light yellow eye; Females are warmer brown than Spangled Cotinga females, which are a dull gray, and often have a pale eye like the male.

Soterrey Mirlo

Soterrey muy grande que tiende a ser común en todo su rango de distribución. Su plumaje es en general pardusco y varía geográficamente: las poblaciones del norte tienen densos puntos marrones oscuros en la región ventral que es más pálida, mientras que las poblaciones del sur son más uniformemente de color marrón medio por encima y por debajo, con pocos puntos en la parte inferior del vientre y de las coberteras subcaudales. Encontrado principalmente en el dosel de bosques húmedos, incluyendo zonas perturbadas; las poblaciones del sur también han sido encontradas en enredaderas y bordes de bosque semi húmedo. Su canto distintivo posee notas potentes, melodiosas y risueñas el cual es escuchado regularmente en cualquier lugar donde esta especie se encuentre

Nombre científico: Campylorhynchus turdinus
Dimensiones: 20-21cm

Thrus-like Wren

Very large soterrey that tends to be common throughout its range. Their plumage is generally brownish and varies geographically: northern populations have dense dark brown spots in the ventral region that are paler, while southern populations are more uniformly medium brown at the top and at the bottom, with few spots. In the lower part of their belly and of the subcaudal coverts. It is found mainly in the canopy of humid forests, including disturbed areas; southern populations have also been found in vines and semi-humid forest edges. Its distinctive song has powerful, melodious and laughing notes which is heard regularly wherever this species is found.

Foto: Jorge Vera

Soterrey Criollo

En casa en los suburbios, parques, granjas y otras áreas abiertas con matorrales densos. En la temporada de reproducción, a menudo está cantando su canto efervescente desde la parte superior de un arbusto o un poste de la cerca. El plumaje no muestra mucho contraste: principalmente marrón, ligeramente más pálido debajo, con algunas barras oscura en las alas y la cola. No tiene ceja blanca. En invierno son más secretivos, prefiriendo estar en enredaderas y matorrales. Ocurre desde el sur de Canadá hasta la parte más al sur de Suramérica.

Nombre científico: Troglodytes aedon
Dimensiones: 11-12 cm

House Wren

Foto: Jorge Vera

Found in the suburbs, parks, farms, and other open areas with dense brush. In breeding season, it is often singing its effervescent song from the top of a bush or fence post. Its plumage does not show much contrast: mainly brown, slightly paler underneath, with some dark bars on the wings and tail. They have no white eyebrow. In winter they are more secretive, preferring to remain in vines and bushes. It can be found from southern Canada to the southernmost part of South America.

Autillo Ventrileonado

Autillo pequeño con una distribución dispersa en los Andes. Habita en bosques nublados en el sureste de Ecuador. La mayoría de los individuos tienen un plumaje de color canela-anteado brillante, otro pueden ser marrones color cuero. su vocalización. Su canto es una serie rápida, ascendente y descendente de notas suaves ("piu"). La velocidad a la que se producen estas notas es bastante variable.

Nombre científico: Megascops watsonii

Dimensiones: 21-23 cm

Foto: Jesenia Catillo

Tawny-bellied Screech-Owl.

Small scops owl with a scattered distribution in the Andes. It lives in cloudy forests in southeastern Ecuad r. Most individuals have glossy tan-buffy plumage, others may be leathery brown. It is distinguished from the similar Rufescent Screech-Owl (Megascops ingens) by lacking white markings on the shoulders and by its vocalization. Their song is a rapid, ascending and descending series of soft notes ("piu"). The speed at which these notes are produced is quite variable.

Mochuelo Ferruginoso

Tecolote pequeño de tierras bajas tropicales, ampliamente distribuido y generalmente común, suele verse y escucharse durante el día. Prefiere bosques tropicales abiertos y sus bordes, vegetación secundaria con árboles (incluyendo parques en pueblos y ciudades) así como pastizales con pinos. A veces se puede encontrar debido a silbidos persistentes o a una parvada de aves pequeñas que lo acosan mientras percha, ya sea en una rama abierta o dentro del follaje. Su color varía de canela a grisáceo en general, aunque todas las variaciones tienen un barrado blanco muy fino en la corona (no son puntos) y muchas barras oscuras delgadas en la cola.

Nombre científico: Glaucidium brasilianum
Dimensiones: 16-17cm

Foto: Jorge Vera

Ferruginous Pygmy-Owl

Small tropical lowland owl, it is widely distributed and generally common, it is often seen and heard during the day. It prefers open tropical forests and their edges, secondary vegetation with trees (including parks in towns and cities) as well as grasslands with pine trees. It can sometimes be found due to persistent hissing or a flock of small birds harassing it as it perches, either on an open branch or within foliage. Their color varies from cinnamon to greyish in general, although all variations have very fine white baring on the crown (not dots) and many thin dark bars on the tail.

Autillo Tropical

As with all small owls, this bird is much easier to identify by its vocalization - a quick, short warble with a pop at the end. If you are lucky enough to see one, it is a grayish-brown bird with fine markings, including fine stripes on the undersides. It has black marks surrounding its face. Equal sexes. It is found in wooded habitats, sometimes it comes out into open shrubby or garden areas with a few scattered trees. It is usually the most common owl in its range.

Nombre científico: Megascops choliba
Dimensiones: 23-25cm

Tropical Screech-Owl

Foto: Jorge Vera

As with all small owls, this bird is much easier to identify by its vocalization - a quick, short warble with a pop at the end. If you are lucky enough to see one, it is a grayish-brown bird with fine markings, including fine stripes on the undersides. It has black marks surrounding its face. Equal sexes. It is found in wooded habitats, sometimes it comes out into open shrubby or garden areas with a few scattered trees. It is usually the most common owl in its range.

Búho Penachudo

Búho grande y espectacular de selvas perennifolias en tierras bajas tropicales y laderas de montaña. A veces percha en parejas a niveles bajos en el bosque, incluso en sitios muy abiertos. Las aves perchadas suelen mantener cerrados sus tupidos “cuernos” o cejas blancas, pero los eleva al alertarse. De noche prefiere el dosel del bosque denso. Localizarlos cuando vocalizan puede ser muy difícil. El llamado es un “gruñido” corto, gutural y creciente, que típicamente se repite cada cinco a diez segundos.

Nombre científico: Lophostrix cristata

Dimensiones: 36-42 cm

Crested Owl

Foto: Camilo Granda

Spectacular large owl from evergreen rainforests in tropical lowlands and mountain slopes. Sometimes rests in pairs at low highs in the forest, even in very open places. Perching birds tend to keep their bushy "horns" or white eyebrows closed, but they raise them when alerted. At night it prefers the canopy of the dense forest. Locating them when they vocalize can be very difficult. Its call is a short, guttural, rising "growl," typically repeated every five to ten seconds.

Cardenal Gorrirrojo

Tángara pequeña, contrastantemente coloreada que se encuentra en la vegetación alrededor de lagos y ríos. Son reconocidos instantáneamente por la cabeza roja brillante y el plumaje blanco y negro. Muy social y, a menudo se encuentran en pares o grupos, forrajeando bajo en la vegetación de la orilla. Frecuentemente se percha en ramas que salen del agua.

Nombre científico: Paroaria gularis
Dimensiones: 16-17 cm

Foto: Jorge Vera

Red-capped Cardenal

Small, contrastingly colored tanager found in vegetation around lakes and rivers. They are instantly recognized by its bright red head and black and white plumage. It is Very social and it is often found in pairs or groups, foraging in shore vegetation. It often perches on branches that come out of the water.

Bienteveo Menor

Este mosquero es marrón arriba y amarillo brillante abajo con un patrón blanco y negro en la cabeza; muy similar en el plumaje a una gran cantidad de otras especies incluyendo Great Kiskadee y Rusty-margined Flycatcher. Sin embargo, nota el tamaño más pequeño de Lesser Kiskadee, su forma esbelta y su pico más largo y delgado. Sexos similares. Se encuentra solo o en pares, casi exclusivamente alrededor de cuerpos de agua de movimiento lento en las tierras bajas del norte de Suramérica. Fácil de encontrar; tiende a percharse conspicuamente a menudo cerca de la superficie del agua. También escucha por sus llamadas, un zumbido rasposo largo, que ayudan a distinguirlo de especies similares.

Nombre científico: Pitangus lictor
Dimensiones: 17-18 cm

Lesser Kiskadee

Foto: Jorge Vera

This flycatcher is brown above and bright yellow below with a black and white pattern on its head; very similar in plumage to a large number of other species including Great Kiskadee and Rusty-margined Flycatcher. However, note Lesser Kiskadee's smaller size, slender shape, and longer, thinner bill. Both sexes are similar. It is found alone or in pairs, almost exclusively around slow-moving bodies of water in the lowlands of northern South America. It is Easy to find; it tends to perch conspicuously often near the surface of the water. Listen to its call, a long scratchy buzz, which helps distinguish it from other similar species.

Momoto Piquiancho

Pájaro de bosque de tamaño mediano que le gusta percharse inmóvil. Cabeza y pecho marrón anaranjado con la máscara y el punto del pecho negros. Espalda y vientre verdes; cola larga. Más similar al más grande Rufous Motmot; nota su tamaño y la barbilla verde. A menudo se encuentran solos o en parejas dentro del bosque, generalmente por debajo del dosel. Escucha por una llamada como de rana "aww", similar a Keel-billed Motmot.

Nombre científico: Electron platyrhynchum
Dimensiones: 33-36 cm

Broad-billed Motmot

Foto: Jorge Vera

Medium-sized woodland bird that likes to perch motionless. With Orange brown head and chest with black mask and breast spot, Green back and belly; and long tail. They are more similar to the larger Rufous Motmot; notice their size and green chin. They are often found singly or in pairs within the forest, usually below the canopy. Its call is a frog-like "aww" sound, similar to Keel-billed Motmot.

Titira Colinegro

Ave grande, robusta, colicorta y blanquinegra del dosel de áreas boscosas y bosques secundarios. Normalmente avistada en parejas. Los machos son mayormente blancos con cabeza, cola y alas negras. Presta atención al parche de piel rojo alrededor de los ojos y al pico negro pero rojo en su base. Las hembras son ampliamente rayadas en la espalda, el cuello y la región ventral y tienen la cabeza y la espalda de color marrón. Su canto es un nasal "güic", parecido a una rana.

Nombre científico: Tityra cayana
Dimensiones: 21-22 cm

Black-tailed Tityra

Foto: Jorge Vera

Large, robust, short-tailed, and black-white bird of the canopy of wooded areas and secondary forests. Usually sighted in pairs. Males are mostly white with a black head, tail, and wings. Pay attention to the patch of red skin around its eyes and the black but red bill at its base. Females are broadly striped on the back, neck, and belly and have a brown head and back. Its song is a nasal "güic", similar to a frog.

Oropéndola Dorsirrojiza

Oropéndola de tamaño mediano. Bastante común en tierras bajas pero parece ser escaso en el bosque montano. Puede ocurrir hasta los 2,500 m en los Andes, donde usualmente es la única oropéndola y es poco probable confundirla. Generalmente oliva con tonos rojizos más cálidos en la espalda y la rabadilla. El color del pico es variable: negruzco oscuro en las tierras bajas amazónicas y generalmente amarillento en los Andes. Nota las plumas amarillas exteriores de la cola como otras oropéndolas. Típicamente en bandadas que forrajean en el dosel, a veces en bandadas mixtas con otras oropéndolas o caciques. Escucha por un sonido crepitante seguido de uno que suena como una gota de agua.

Foto: Darwin Vivanco

Nombre científico: Psarocolius angustiforns
Dimensiones: 35-48 cm

Russet-backed Orependula

Oropendola of medium size. Fairly common in lowlands but appears to be rare in montane forest. It can be found up to 2,500 m in the Andes, where it is usually the only oriole and is unlikely to be confused. It is Generally olive with warmer reddish tones on the back and rump. The color of its bill is variable: dark blackish in the Amazonian lowlands and generally yellowish in the Andes. Notice the outer yellow tail feathers like other orioles. Typically in flocks foraging in the canopy, sometimes in mixed flocks with other orioles or caciques. It makes a crackling sound followed by one that sounds like a drop of water.

Foto: Carlos Landazuri

Nido de Oropéndola

Esta ave hace sus nidos formando grupos con 5 a 10 nidos, siempre juntos unos de otros en un área del mismo árbol. Construyen sus nidos con fibras vegetales y hojas de plantas que forman un saco colgándolos de alguna rama de un árbol que puede medir hasta 1 m de largo.

Gallinazo Cabeza Roja

En la distancia parece oscuro. De cerca, se ve que es marrón oscuro arriba con la cabeza roja pelada. En vuelo, las partes inferiores de las alas son de dos tonos; más claro en todo el borde de arrastre del ala, en oposición a sólo las puntas de las alas en Black Vulture. Mantiene las alas ligeramente levantadas cuando vuela, dando la apariencia de una forma de "V" si se observa de frente. Tiende a tambalearse en vuelo. Aleteos más lentos y más profundos que Black Vulture. Se desliza relativamente bajo mientras olfatea por carroña, de lo contrario, en corrientes térmicas que lo conducen a puntos de vista más altos. También se amontona alrededor de victimas de colisiones a lo largo de carreteras o recogiendo comida en los contenedores de basura.

Nombre científico: Cathartes aura
Dimensiones: 64-76 cm

Turkey Vulture

Foto: Jorge Vera

From the distance it seems dark. Up close, it is seen to be dark brown on top with a peeled red head. In flight, its undersides of the wings are two-toned; clearer around the trailing edge of the wing, as opposed to just the wingtips in Black Vulture. It Keeps wings slightly raised when flying, giving the appearance of a "V" shape when viewed from the front. It tends to stagger in flight. With slower and deeper beats than Black Vulture. It glides relatively low while sniffing for carrion, otherwise in thermal currents leading to higher vantage points. They also huddle around crash victims along roads or picking up food in trash cans.

Gallinazo Cabeza Amarilla

Zopilote ampliamente distribuido y común en las tierras bajas del bosque lluvioso. La cabeza puede no parecer amarilla, a menos que se vea a corta distancia. Se identifica mejor por su vuelo estable con las alas sostenidas en un ligero ángulo diedro. Parecido a Turkey Vulture, pero tiene alas más anchas que son sostenidas más planas y no se balancea de lado a lado tan a menudo. Ocurre en bosque lluvioso, ciudades y áreas agrícolas.

Nombre científico: Cathartes melambrotus
Dimensiones: 74-80 cm

Foto: Jorge Vera

Greater Yellow-headed Vulture

It is a widely distributed Vulture, commonly found in lowland rainforest. Its head may not appear yellow, unless it is seen at close range. It is best identified by its stable flight with the wings held at a slight dihedral angle. It is Similar to Turkey Vulture, but has wider wings that are held flatter and doesn't swing side to side as often. It can be found in rainforest, cities, and agricultural areas.

Gallinazo Rey

Ave espectacular, grande y poco común de los bosques tropicales de tierras bajas, principalmente en sitios más silvestres alejados de poblados humanos. Es más frecuente verlos planeando alto alrededor del mediodía, usualmente muy alto en compañía de grupos de Black Vulture; es raro verlo perchado. El adulto es impresionante: cabeza y cuello coloridos, ojos penetrantes blancos y plumaje blanco en general con una orilla negra en alas y cola. El inmaduro es negruzco en general pero carece de las marcas blancas en las alas a diferencia del Black Vulture. Los inmaduros desarrollan el plumaje adulto en varios años, el blanco les aparece primero en el vientre y la parte interna de las alas.

Foto: Eliecer Magno

Gallinazo Cabeza Negra

Uniforme negro con parches plateados en la parte inferior de las puntas de las alas. En vuelo, las alas anchas y redondeadas con "dedos" característicos son mantenidas planas como una tabla. Observa la cola muy corta y la pequeña cabeza negra. Se eleva en bandadas, a menudo con Turkey Vultures y gavilanes. El estilo de vuelo es distintivo; como un murciélago, da aleteos fuertes y rápidos seguidos de deslizamientos cortos. Búscalo a lo largo de carreteras comiendo victimas de colisiones, o recogiendo su comida en los contenedores de basura.

Nombre científico: Coragyps atratus
Dimensiones: 56-66 cm

Black vulture

Foto: Alex Boas

It has a Black uniform with silver patches on the underside of the wingtips. In flight, their broad, rounded wings with characteristic "fingers" are kept flat as a board. Notice its very short tail and the small black head. It soars in flocks, often with Turkey Vultures and hawks. Its style of flight is distinctive; like a bat, it gives strong, rapid flaps followed by short glides. Can be found along roads eating crash victims, or picking up his food in garbage cans.

Paloma colorada

Paloma grande de sabanas inundables, riveras, áreas abiertas con árboles intercalados, localmente en algunos pueblos. Su cabeza gris contrasta con el cuerpo rosado, pero su vientre blanco no contrasta mucho con su cola grisácea. Compara con la Red-billed Pigeon que es más obscura, suele estar presente en las mismas áreas, pero prefiere hábitats más secos y arbolados. También note el pico negro de la Pale-vented Pigeon, y su canto distintivo: después de un "cú" largo inicial, una frase repetitiva típicamente de tres sílabas, a diferencia del arrullo de 4 sílabas de la Red-billed Pigeon.

Pale-vented Pigeon

Large pigeon from flooded savannas, riverbanks, open areas with interspersed trees, and in some towns. Its gray head contrasts with its pink body, but its white belly does not contrast much with its grayish tail. Compared with the Red-billed Pigeon which is darker, usually found in the same areas but prefers drier and wooded habitats. Notice the black beak of the Pale-vented Pigeon, and its distinctive song: after a long initial "cú", a typically repeating three-syllable phrase, as opposed to the 4-syllable coo of the Red-billed Pigeon.

Foto: Jorge Vera

Nombre científico: Patagioenas cayennensis
Dimensiones: 28-31cm

Paloma Perdiz Rojiza

Paloma grande de sabanas inundables, riveras, áreas abiertas con árboles intercalados, localmente en algunos pueblos. Su cabeza gris contrasta con el cuerpo rosado, pero su vientre blanco no contrasta mucho con su cola grisácea. Compara con la Red-billed Pigeon que es más obscura, suele estar presente en las mismas áreas, pero prefiere hábitats más secos y arbolados. También note el pico negro de la Pale-vented Pigeon, y su canto distintivo: después de un "cú" largo inicial, una frase repetitiva típicamente de tres sílabas, a diferencia del arrullo de 4 sílabas de la Red-billed Pigeon.

Nombre científico: Geotrygon montana
Dimensiones: 22-24cm

Ruddy Quail-Dove

Foto: Jesenia Castillo

Large pigeon from flooded savannas, riverbanks, open areas with interspersed trees, and in some towns. Its gray head contrasts with its pink body, but its white belly does not contrast much with its grayish tail. Compared with the Red-billed Pigeon which is darker, usually found in the same areas but prefers drier and wooded habitats. Notice the black beak of the Pale-vented Pigeon, and its distinctive song: after a long initial "cú", a typically repeating three-syllable phrase, as opposed to the 4-syllable coo of the Red-billed Pigeon.

Espiguero Negriazulado

Pequeña ave muy común en campos con arbustos y malezas, granjas y otros pastizales abiertos en tierras bajas tropicales y laderas de cerro y montaña. Nota su tamaño muy pequeño y pico cónico y puntiagudo. El plumaje reproductivo azul-negro del macho sólo se observa en la temporada húmeda de verano; las aves jóvenes y en muda presentan manchas azul-negro y café. Las hembras son todas café con el pecho estriado. En su canto de cortejo, el macho se eleva desde una espiga en el pasto o una cerca, emitiendo un sonido de zumbido corto, que repite varias veces.

Nombre científico: Volatinia jacarina
Dimensiones: 10-11 cm

Foto: Jorge Vera

Blue-black Grassquit

Large pigeon from flooded savannas, riverbanks, open areas with interspersed trees, and in some towns. Its gray head contrasts with its pink body, but its white belly does not contrast much with its grayish tail. Compared with the Red-billed Pigeon which is darker, usually found in the same areas but prefers drier and wooded habitats. Notice the black beak of the Pale-vented Pigeon, and its distinctive song: after a long initial "cú", a typically repeating three-syllable phrase, as opposed to the 4-syllable coo of the Red-billed Pigeon.

Eufonia Ventrinaranja

Pájaro pequeño parecido a un pinzón, compacto y de cola corta. Generalmente amarillo por abajo y azul oscuro arriba con el pico corto y grueso. Para identificar los machos de eufonias, concéntrate en la corona y la garganta: Orange-bellied tiene una gorra amarilla y una garganta oscura, y el vientre ligeramente amarillo anaranjado. Las hembras son extremadamente difíciles de separar de otras eufonias, pero a menudo se ven en parejas o en pequeños grupos con machos. Frecuentan hábitats boscosos abiertos, bordes y jardines. Puede formar bandadas de forrajeo con otras especies como reinitas y tangaras.

Nombre científico: Euphonia xanthogaster
Dimensiones: 11-12cm

Orange-bellied Euphonia

Foto: Jesenia Castillo

Small, compact, short-tailed finch-like bird. Generally yellow at the bottom and dark blue at the top with short, thick bill. To identify male euphonia, you can focus on the crown and throat: Orange-bellied has a yellow cap and a dark throat, and a slightly orange-yellow belly. Females are extremely difficult to separate from other Euphonia, but they are often seen in pairs or small groups with males. They frequent open wooded habitats, borders, and gardens. It can form foraging flocks with other species such as warblers and tanagers.

Jacamar Grande

Jacamar más grande. Es verde esmeralda brillante arriba y anaranjado abajo con un pico grueso y negro. Sexos generalmente similares; los machos tienen la garganta completamente verde y un collar blanco ligeramente visible; las hembras tienen la garganta anaranjada. El tamaño y la forma del pico podrían recordar un motmot más que una jacamar, pero ningún motmot tiene la cabeza verde y el vientre anaranjado. Solitarios o parejas son poco comunes o raros en los bosques de tierras bajas, hasta cerca de 600 m. Típicamente, se percha en los niveles medios y superiores del bosque, y pueden ser bastante vocal. Escucha por el largo silbido descendente con una interrupción notable en tono cerca del comienzo, así como por varios ruidos extraños que suenan como los de un gato muy enojado.

Nombre científico: Jacamerops aureus
Dimensiones: 29-31cm

Great Jacamar

Foto: Jorge Vera

The largest jacamar. It is bright emerald green at the top and orange at the bottom, with a thick, black bill. Generally similar sexes; males have completely green throats and a slightly visible white collar; females have orange throats. The size and shape of the beak might be more reminiscent of a motmot than a jacamar, but no motmot has a green head and an orange belly. Solitaries or pairs are uncommon or rare in lowland forests, up to about 600 m. typically, they perch in the middle and upper levels of the forest, and can be quite vocal. They have a long descending hiss with a noticeable drop in tone near the beginning, as well as various strange noises that sound like a very angry cat.

Jacamar Orejiblanco

Ave de aspecto corpulento, con cabeza pequeña y pico más grande que otros jacamares, evoca a un martín pescador. Color castaño, en general, con pico rojo-rosáceo. Presente en tierras altas húmedas y bosques estacionalmente inundables, donde se le ve con más frecuencia realizando vuelos cortos para atrapar a sus presas desde ramas expuestas, a menudo en pequeños grupos

Nombre científico: Galbalcyrhynchus leucotis
Dimensiones: 19-20cm



White- eared Jacamar

Foto: Jorge Vera

A stout-looking bird with a small head and bill larger than other jacamars, it evokes a kingfisher. Brown colored, in general, with a red-pinkish bill. It is Present in humid highlands and seasonally flooded forests, where it is mostly seen making short flights to catch prey from exposed branches, often in small groups

Jacamar Colirrufo

Ave verde con rojizo, bien parecida y esbelta, de tierras bajas tropicales húmedas. Vive en bosques perennifolios, frecuentemente en bordes y claros adyacentes. Se percha muy derecho a niveles medios, en lianas o bejucos u otras perchas expuestas desde donde caza insectos al vuelo, especialmente mariposas, libélulas y avispas. Note el pico negro muy largo y esbelto (como de colibrí gigante). La garganta es blanca en el macho y beige en la hembra. Su llamado es un chillido fuerte que llama la atención.

Nombre científico: Galbula ruficauda
Dimensiones: 19-21 cm

Yellow-billed Jacamar

Foto: Carlos Landazuri

Good looking and slender green with reddish bird from humid tropical lowlands. It lives in evergreen forests, often on adjacent edges and clearings. It perches very upright at medium levels, on lianas or lianas or other exposed perches from where it hunts insects on the fly, especially butterflies, dragonflies and wasps. They have a very long and slender black bill (like a giant hummingbird). Males have a white throat while the females have a beige one. Their call is a loud, attention-grabbing screech.

Donacobio

Inconfundibles, encontrado en hábitats pantanosos de tierras bajas desde el extremo este de Panamá hasta el norte de Argentina. Sus características distintivas incluyen partes superiores de color marrón oscuro (más negras en la cabeza), partes inferiores beige, ojos amarillos penetrantes, un parche blanco en las alas y puntas blancas grandes en la cola. A menudo son vocales y conspicuos; los pares se perchan en lo abierto y emiten vocalizaciones fuertes y parloteos estridentes.

Nombre científico: Donacobius atricapilla
Dimensiones: 21-22cm

Black- capped Donacobius

Unmistakable birds, found in lowland swampy habitats from far eastern Panama to northern Argentina. Their distinctive features include dark brown upperparts (blacker on the head), beige underparts, piercing yellow eyes, a white wing patch, and large white tips on the tail. They are often vocal and conspicuous; the pairs rest in the open, emitting loud vocalizations and strident chatter.

Foto: Jorge Vera

Hormiguero Plomizo

Hormiguero grande y colicorto del sotobosque de bosques inundables de llanura. Ambos sexos son mayormente grises con un parche azul de piel desnuda alrededor del ojo y prominentes puntos blancos en el hombro. Las hembras son particularmente distintivas, poseen extenso anaranjado en la región ventral. Se alimenta solo o en parejas en sotobosque denso, como vegetación de ribera y matorrales de Heliconia. Su canto es un trino acelerado y risueño.

Nombre científico: Myrmelastes hyperythrus
Dimensiones: 17-18 cm

Plumbeous Antbird

Foto: Jesenia Castillo

Large and short-tailed ant eating bird in the understory of floodplain forests. Both males and females are mostly gray with a blue patch of bare skin around the eye and prominent white spots on the shoulder. The females are particularly distinctive, they have extensive orange in the ventral region. They feed singly or in pairs in dense understory, such as riparian vegetation and Heliconia scrub. Its song is an accelerated and laughing trill.

Pájaro Paraguas Amazónico

Pájaro espectacular de la región amazónica y laderas andinas adyacentes. Parece un cuervo enorme con una cresta tupida, una trenza gruesa que cuelga de su garganta y ojos pálidos. El macho es más grande que la hembra, con la carúncula más larga (cubierto de plumas) y un parche blanco en la parte delantera de su cresta. El vuelo es ondulado, parecido al de un pájaro carpintero. Habita en el bosque lluvioso alto, a menudo a lo largo de ríos. Los machos se reúnen en sitios de despliegue donde extienden sus carúnculas y emiten mugidos de tono bajo.

Nombre científico: Cephalopterus ornatus
Dimensiones: 42-49 cm

Foto: Jaime Gavidia

Amazonian Umbrellabird

Spectacular bird from the Amazon region and adjacent Andean slopes. It looks like a huge crow with a bushy crest, it has a thick braid hanging down its throat, and pale eyes. The male is larger than the female, with a longer caruncle (covered in feathers) and a white patch at the front of its crest. Its flight is wavy, similar to that of a woodpecker. It inhabits high rain forest, often along rivers. Males gather at deployment sites where they spread their caruncles and emit low-pitched bellows.

Caracara Negro

Rapaz del tamaño de un cuervo que se encuentra típicamente cerca de los bordes del bosque y ríos. Es totalmente negro, excepto por la rabadilla blanca brillante y la piel facial y patas brillantes. Similar a Red-throated Caracara que ocurre en interiores de bosques, pero tiene un plumaje negro más extenso y se encuentra en hábitats más abiertos. Frecuentemente anda en pares o grupos y se encuentra a menudo cerca de los humanos en áreas agrícolas y pueblos ribereños

Nombre científico: Daptrius ater
Dimensiones: 40-43cm

Black Caracara

Raven-sized raptor typically found near forest and river edges. It is totally black except for the shiny white rump and shiny facial skin and legs. Similar to Red-throated Caracara that can be found indoors in forests, but has more extensive black plumage and is found in more open habitats. It frequently walks in pairs or groups and is often found close to humans in agricultural areas and riverside towns.

Foto: Carlos Landazuri

Negro Ojipálido

Negro mediano encontrado localmente en hábitats con herbazales húmedos. Es negro brillante, sus ojos pueden ser blancos o amarillo claro y su pico es negro muy puntiagudo. Es mucho más pequeño que Giant Cowbird (Molothrus oryzivorus), el cual ocasionalmente tiene ojos pálidos y puede parecer similar. Además, se diferencia del también similar Velvet-fronted Grackle (Lampropsar tanagrinus) por sus ojos pálidos, pico más largo y puntiagudo y cola más corta. Presente en pastizales húmedos y en márgenes herbáceos de algunos brazos muertos de río (lagos de herradura), donde se alimenta individualmente, en pareja o en pequeños grupos.

Nombre científico: Agelasticus xanthophthalmus
Dimensiones: 20-21cm

Pale-eyed Blakbird

Medium black bird found locally in moist grassland habitats. It is shiny black, its eyes can be white or light yellow, and its beak is very pointed black. It is much smaller than the Giant Cowbird (Molothrus oryzivorus), which occasionally has pale eyes. In addition, it differs from the also similar Velvet-fronted Grackle (Lampropsar tanagrinus) by its pale eyes, longer and pointed bill, and shorter tail. It can be found in humid grasslands and in herbaceous margins of some dead branches of the river (horseshoe lakes), where it feeds individually, in pairs or in small groups.

Foto: Humberto Castillo

Pinzón Sabanero Azafranado

Ampliamente distribuido y común pero con distribución irregular. El macho es amarillo brillante saturado de anaranjado en la frente. Típicamente, muestra tonos menos marrón-oliva en la espalda y las alas que muchos yellowfinches, pero las poblaciones sureñas de Saffron son más opacas y más marrones arriba. Las hembras son más opacas que los machos, con las poblaciones sureñas incluso más marrones y rayadas. Podría confundirse con Grassland Yellowfinch, pero esa especie suele ser más opaca y más rayada. Orange-fronted Yellowfinch es más pequeño. Saffron Finch se encuentra en hábitats abiertos y secos, incluyendo áreas agrícolas y pueblos. A menudo en bandadas.

Nombre científico: Sicalis flaveola
Dimensiones: 13-14 cm

Saffron Finch

Foto: Jorge Vera

It is widely distributed and common but unevenly distributed. The male is bright yellow saturated with orange on the forehead. Typically shows less olive-brown on back and wings than many yellowfinches, but southern Saffron populations are duller and browner at the top. Females are duller than males, with southern populations, even darker and striped. It could be confused with Grassland Yellowfinch, but that species is usually duller and more striped. The orange-fronted Yellowfinch is smaller. Saffron Finch is found in open, dry habitats, including agricultural areas and villages. Often in flocks.

Ibis verde

Pájaro vadeador totalmente oscuro, con pico curvado y patas cortas que le dan una apariencia algo rechoncha. Mayormente verde oscuro con un brillo esmeralda y bronceado iridiscente que puede ser impresionante en buena luz. Nunca muestra tonos rojizos como Glossy Ibis. Prefiere pantanos más boscosos o bordes de río protegidos. Usualmente vistos solos o en parejas.

Green ibis

Totally dark wader bird, with a curved bill and short legs with a chubby appearance. It is mostly dark green with an emerald glow and iridescent tan that can be stunning in good light. It never shows reddish tones like Glossy Ibis. It prefers more forested swamps or sheltered river edges. It is usually seen alone or in pairs.

Foto: Carlos Landazuri

Nombre científico: Mesembrinibis cayennensis
Dimensiones: 52-58 cm

Guacamayo Azuliamarillo

Guacamaya distintiva: partes superiores cerúleas y partes inferiores amarillo dorado con la cara blanca y un parche negro en la garganta. Se encuentra en las selvas tropicales y sabanas del este de Panamá hasta Brasil, a menudo en hábitats más abiertos que otras guacamayas. Usualmente se encuentran en pares, volando o perchados en el dosel. Puede juntarse en pequeños grupos, especialmente en árboles con frutos o colpas. Anida en cavidades. Escucha por las llamadas estridentes, típicas de las guacamayas grandes.

Nombre científico: Ara ararauna
Dimensiones: 75-87cm

Blue-and yellow Macaw

Distinctive Macaw: with cerulean upperparts and golden yellow underparts, and with a white face and a black throat patch. It is found in rainforests and savannas from eastern Panama to Brazil, often in more open habitats than other macaws. They are usually found in pairs, flying or perched in the canopy. It can gather in small groups, especially in trees with fruits or clay licks. It nests in cavities. Listen for the shrill calls, typical of large macaws.

Foto: Jorge Vela

Foto: Rodrigo Aguilar Cueva

Guacamayo Rojo

Guacamayo grande y espectacular, de cola larga, extirpada en gran parte de sus áreas debido al tráfico de mascotas. Existen esfuerzos de reintroducción en algunas áreas protegidas. Se le encuentra muy localmente en selvas y áreas semi abiertas con árboles grandes, en tierras bajas. Inconfundible, es rojo escarlata brillante con parches grandes amarillo en las alas, la cola y las alas son casi totalmente azules. Sus llamadas son gritos profundos y guturales que se escuchan a gran distancia.

Nombre científico: Ara macao
Dimensiones: 80-96 cm

Scarlet Macaw

Foto: Vilma Lucero

Large and spectacular macaw, long-tailed, extirpated in much of its areas due to pet trafficking. There are reintroduction efforts for these birds in some protected areas. It is found very locally in jungles and semi-open areas with large trees, in lowlands. They are unmistakable, it is bright red with large yellow patches on the wings, their tail and wings are almost entirely blue. Their calls are deep, guttural screams heard at a great distance.

Guacamayo Frenticastaño

Pequeño para un guacamayo pero aún más grande que cualquiera de los pericos de cola larga. Mayormente verde con cara blancuzca y parte inferior de las alas rojiza (solo visible en vuelo). Sexos similares. Se encuentra en parejas o pequeñas bandadas, en el bosque y también en hábitats abiertos perturbados, incluyendo tierras agrícolas y claros. Escucha por las llamadas muy ásperas.

Nombre científico: Ara severus
Dimensiones: 40-50cm

Foto: Jorge Vera

Chestnut –fronted Macaw

It is Small for a macaw but still larger than any of the long-tailed parakeets. It is mostly green with whitish face and reddish underside of wings (only visible in flight). Both sexes are similar. It can be found in pairs or small flocks, in forest and also in disturbed open habitats, including farmland and clearings. Listen to its very harsh calls.

Guacamayo Ventrirrojo

Guacamaya pequeña del bosque lluvioso de tierras bajas. Prefiere las áreas pantanosas, especialmente aquellas con palmeras, que utiliza para anidar. Frecuentemente vocaliza en vuelo, un agradable "griiah" redoblado. El vientre rojo puede ser difícil de ver en la distancia, pero es diagnóstico si se ve bien. Similar a Chestnut-fronted Macaw, que tiene las axilas marrones (no amarillas), piel facial blanca (no amarilla) y un ojo pálido (no oscuro).

Nombre científico: Orthopsittaca manilatus
Dimensiones: 44-50cm

Red-bellied Macaw

Foto: Alex Boas

Small lowland rainforest macaw. It prefers swampy areas, especially those with palm trees, which it uses for nesting. It frequently vocalizes in flight, a pleasant redoubled "griiah". Its red belly may be difficult to see in the distance, but it is diagnostic if it looks good. It is similar to the Chestnut-fronted Macaw, which has brown underarms (not yellow), white facial skin (not yellow), and a pale eye (not dark).



Perico Alicobál

Loro pequeño de cuerpo verde, larga cola puntiaguda y pico pálido. Los machos tienen parches azules en las alas y en la rabadilla mientras que las hembras son todas verdes. Altamente gregario. Encontrado en bordes de bosque, bosques poco densos, bosques secundarios, hábitats abiertos y parques urbanos, generalmente evita bosques espesos.

Nombre científico: Brotogeris cyanoptera
Dimensiones: 12-13cm

Cobalt Winged Parakeed

Foto: Jorge Vera

Green parakeet with a short tail. Their blue wing feathers are difficult to see when perched, but conspicuous in flight. They are found in a variety of wooded habitats, including on the edges of forests, gardens, and agricultural areas, often in noisy groups. They are different from Tui Parakeet by dark eye, green forehead and peach chin, and from parrotlets by larger size.

Periquito Aliazul

Loro pequeño de cuerpo verde, larga cola puntiaguda y pico pálido. Los machos tienen parches azules en las alas y en la rabadilla mientras que las hembras son todas verdes. Altamente gregario. Encontrado en bordes de bosque, bosques poco densos, bosques secundarios, hábitats abiertos y parques urbanos, generalmente evita bosques espesos.

Nombre científico: Forpus xanthopterygius
Dimensiones: 12-13cm

Foto: Carlos Landazuri

Blue-winged Parrotlet

Small parrot with a green body, it has a long pointed tail and a pale bill. Males have blue wing and rump patches while females are completely green. They are highly gregarious. They are found in forest edges, sparse forests, secondary forests, open habitats, and urban parks, they generally avoid thick forests.

Amazonas: Alinaranja

Loro verde grande con una máscara azul y una corona y mejillas amarillas (cuya extensión puede variar entre individuos). La cola tiene una banda terminal amarilla ancha. Los grandes parches rojo-anaranjado en la parte interna de las alas son evidentes en vuelo y, a veces, cuando están perchados. Se encuentra en una variedad de hábitats boscosos desde bosques altos y húmedos hasta sábanas. También se aventura a zonas urbanas

Nombre científico: Amazona amazonica
Dimensiones: 31-33cm

Orange-winged Amazon

Foto: Darwin Vivanco

Large green parrot with a blue mask and a yellow crown and cheeks (the extent of which may vary between individuals). Its tail has a broad yellow terminal band. Its large orange-red patches on the inside of the wings are evident in flight and sometimes when it is perched. It is found in a variety of wooded habitats from tall, humid forests to savannas. It also ventures into urban areas.

Loro Cabeciazul

Loro de tamaño mediano, cola corta y cuadrada, mayormente verde, pero con la cabeza azul y las cobertoras inferiores de la cola rojas. El plumaje es distintivo si observa bien. Sexos iguales. Nota sus aleteos profundos que no sobrepasan la línea horizontal. Su llamada chirriante sube notablemente en tono, usualmente emitida dos o tres veces.

Nombre científico: Pionus menstruus
Dimensiones: 25-29 cm

Blue-headed Parrot

Medium-sized parrot, with a short square tail, mostly green, but with a blue head and red undercovers. Its plumage is particular if you look closely. Equal sexes. It has deep wing beats that do not exceed the horizontal line. Its screeching call rises noticeably in pitch, usually emitted two or three times.

Foto: Carlos Landazuri

Perico Cabecioscuro

Perico verde de tamaño mediano con una cabeza gris opaca. Las plumas azules brillantes del ala son difíciles de ver cuando están perchado, pero son notables en vuelo. A corta distancia, la piel blanca desnuda alrededor del ojo también es diagnóstica. Se encuentra en el borde del bosque y otras áreas abiertas del bosques, a menudo en pares o grupos. Frecuentemente se encuentran cerca de pueblos y zonas agrícolas.

Nombre científico: Aratinga weddellii
Dimensiones: 25-28 cm

Dusky-headed Parakeet

Foto: Josué Chavez

Medium-sized green parakeet with a dull gray head. Its bright blue wing feathers are difficult to see when perched, but are noticeable in flight. At close range, bare white skin around the eye is also diagnostic. It can be found on the edge of the forest and other open areas of the forest, often in pairs or groups. They are often found near towns and agricultural areas.



Buco Cuelliblanco

Poco común pero sorprendente: es un ave fornida de bosques húmedos en tierras bajas tropicales. Usualmente visto solo o en parejas, percha calladamente en el dosel, a veces en ramas descubiertas. Note el pico negro pesado, usado para encargarse de insectos grandes como cigarras, y su plumaje blanco y negro marcado con una banda negra ancha en el pecho.

Nombre científico: Notharchus hyperrhynchus
Dimensiones: 25-26 cm

White- Necked Puffird

Foto: Jesenia Castillo

Uncommon but surprising: it is a stocky bird of humid forests in tropical lowlands. It is usually seen singly or in pairs, it perches quietly in canopy, sometimes on bare branches. It has a heavy black bill, used to handle large insects such as cicadas, and its black and white plumage is marked with a broad black band across the chest.

Monja Piquiamarilla

Distintiva monja con pico amarillo y parche blanco en el hombro. Presente en bosque de tierra firme y bordes del bosque, donde se alimenta en el dosel, en áreas con enredaderas y alrededor de claros de bosque producidos por la caída de árboles. Se la encuentra frecuentemente en densos matorrales de bambú, también en aquellos árboles que emergen de estos matorrales. Suele alimentarse en pequeños grupos, los cuales emiten variados gorjeos, normalmente más agitados que los de otras monjas.

Nombre científico: Monasa flavirostris
Dimensiones: 24-26 cm



Yellow-billed Numbird

Foto: Carlos Landazuri

Green parakeet with a short tail. Their blue wing feathers are difficult to see when perched, but conspicuous in flight. They are found in a variety of wooded habitats, including on the edges of forests, gardens, and agricultural areas, often in noisy groups. They are different from Tui Parakeet by dark eye, green forehead and peach chin, and from parrotlets by larger size.

Buco Golondrina

A menudo se lo ve posado en cercas y cables eléctricos a lo largo de carreteras en zonas con matorrales, así como en bordes de bosque. También encontrado cerca de terraplenes de arena donde anidan en madrigueras. Su cuerpo es mayormente azul marino con vientre rojizo, donde las coberteras subcaudales, la rabadilla y las alas son blancas. Mientras realiza vaivenes aéreos, muestra sus largas y anchas alas así como sus separados "dedos" alares.

Nombre científico: Chelidoptera tenebrosa
Dimensiones: 16-17cm

Foto: Jorge Vera

Swallow-winged Puffbird

It is often seen perched on fences and power lines along roadsides in brushy areas, as well as on forest edges. It is also found near sand embankments where they nest in burrows. Its body is mostly navy blue with a reddish belly, where the undercoats, rump and wings are white. While performing aerial swings, it displays its long and wide wings as well as its spread wing "fingers."

Golondrina Fajiblanca

Golondrina pequeña e inconfundible de ríos de tierras bajas. La combinación del plumaje negro brillante, que parece azúl- metálico con buena luz, con una banda blanca brillante en el pecho es única. La cola profundamente bifurcada es fácil de ver en vuelo. Casi siempre en pares o grupos, y puede ser particularmente común en áreas con bancos altamente expuestos, donde anidan. Frecuentemente se percha en ramas desnudas y troncos a lo largo de bordes de ríos.

Foto: Jorge Vera

Nombre científico: Atticora fasciata
Dimensiones: 14-15cm

White –banded Swallow

Small and unmistakable swallow of lowland rivers. The combination of its glossy black plumage, which appears metallic blue in good light, with a bright white chest band is unique. Its deeply forked tail is easy to see when it is flight. It is most often found in pairs or groups, and can be particularly common in areas with highly exposed shoals, where they nest. It frequently perches on bare branches and logs along riverbanks.

Martín Pechipardo

Golondrina grande con distintiva banda marrón en el pecho. La banda del pecho está típicamente bien delimitada, pero puede verse difusa con algunas manchas sobre el centro del pecho y hasta el vientre. Por lo demás, es marrón arriba y pálido abajo. Similar en el plumaje a Bank Swallow pero más grande y más alargada. Se encuentra en tierras bajas, generalmente en áreas abiertas cerca del agua, ya sea solos o en bandadas dispersas.

Nombre científico: Progne tapera
Dimensiones: 17-18 cm

Brown-chested Martin

Large swallow with a particular brown chest band. Its chest band is typically well defined, but can be diffuse with some spots over the center of the chest and down to the belly. Otherwise it is brown above and pale below. Its plumage is similar to Bank Swallow but larger and more elongated. It is found in lowlands, usually in open areas near water, either singly or in scattered flocks

Foto: Carlos Landazuri

Golondrina Aliblanca

Golondrina común de las tierras bajas tropicales con una espalda azúl-verde brillante. Los grandes parches blancos del ala son fácilmente visibles en vuelo y en aves perchadas. La cola bifurcada y la rabadilla blanca reluciente también son evidentes en vuelo. Típicamente forrajea bajo sobre el agua. Pares o grupos frecuentemente se perchan en ramas en ríos y lagos.

Nombre científico: Tachycineta albiventer
Dimensiones: 13-14 cm

White –winged Swallow

Foto: Jorge Vera

Tropical lowland swallow with a bright blue-green back. Its large white wing patches are easily visible in flight and on perching birds. Its forked tail and gleaming white rump are also evident in flight. It typically forages low on water. The Pairs or groups frequently perch on branches in rivers and lakes.

Martín Pechigrís

Golondrina grande tropical de tierras bajas; ambos sexos se parecen a la hembra de la Golondrina Azulnegra de Norte América. Bastante común en pueblos, villas, y campos abiertos con arboles altos u otras estructuras que tengan cavidades para anidar. Por arriba son azul oscuro (más brillante en machos), de garganta y pecho oscuros, por debajo son blanquecinos (los del Amazonas son diferentes, quizás otra especie). No tienen la frente ni el collar blaquecino pálido de la hembra Golondrina Azulnegra. Son mas grandes que la Golondrina Alas Acerradas, y su cola tiene una bifurcación más pronunciada y es azul por arriba.

Nombre científico: Progne chalybea
Dimensiones: 18-19 cm

Grey-breasted Martin

Foto: Jesenia Castillo

Large tropical lowland swallow; both sexes resemble the female North American Black Swallow. It is fairly common in towns, villages, and open fields with tall trees or other structures that have cavities for nesting. They are dark blue at the top (brighter in males), with a dark throat and chest, at the bottom they are whitish (those of the Amazon are different, perhaps another species). They do not have the forehead or pale white collar of the female Black Blue Swallow. They are larger than the Swallow-winged Swallow, and their tail has a more pronounced bifurcation and is blue at the top. Natural Regions: Coastal Deciduous Forest, Amazonian Tropical Humid Forest, Chocó Tropical Humid Forest, Western Montane Forest, Eastern Montane Forest, Western Piemontan Forest, Eastern Piemontan Forest, Inter-Andean Scrub, Dry Coastal Scrub

Cuclillo Piquioscuro

Marrón arriba y beige abajo con un pico negro, máscara negra y corona gris. El anillo ocular es amarillento y los ojos son oscuros. La cola es larga y negra con grandes manchas blancas cuando se ve desde abajo. Se encuentra en arboledas, bosque secundario, bordes de bosques, plantaciones, bosques ribereños y manglares. Su vocalización es baja, profunda y descendente "caul-caul-caul".

Nombre científico: Coccyzus melacoryphus
Dimensiones: 27-28cm

Dark-billed Cuckoo

Foto: Carlos Landazuri

This crown is brown at the top and beige below with a black bill, black mask, and gray. Its eye ring is yellowish and the eyes are dark. Its tail is long and black with large white spots when seen from below. It is usually found in groves, secondary forest, forest edges, plantations, riparian forests, and mangroves. Its vocalization is low, deep and descending "caul-caul-caul".



Nictibio Grande

Ave nocturna monstruosa, superficialmente similar a un búho pero no relacionado. Pálido y moteado de gris con cabeza grande; es más grande que otros pájaros estaca y carece de bigote oscuro. Se camufla bien y es difícil de detectar; más a menudo visto descansando en una rama horizontal durante el día (menos a menudo en una rama rota como otros pájaros estaca). Se encuentra en áreas boscosas y bordes. Activo durante la noche, cuando se alimenta de grandes insectos. Escucha su llamada aterradora, un grito agudo y descendente

Nombre científico: Nyctibius grandis
Dimensiones: 43-48 cm

Great Potoo

Foto: Jorge Vera

Monstrous night bird, superficially similar to an owl but not related. It is pale and mottled gray with a large head; it is larger than other stake birds and lacks a dark mustache. It camouflages well and is difficult to detect; it is most often seen resting on a horizontal branch during the day (less often on a broken branch like other stake birds). It can be found in wooded areas and edges. It is active at night, when feeding on large insects. It has a terrifying call, a high-pitched, descending cry



Chotacabras Coliescalera

Chotacabras grande de playas y vegetación a la orilla de cuerpos de agua en las tierras bajas. Marrón grisáceo con marcas pálidas indistintas y una cola bastante larga; en vuelo, los machos muestran grandes cuñas blancas en las plumas externas de la cola. Durante el día descansa en la vegetación a lo largo de las orillas de lagos y ríos y forrajea en las playas durante la noche. No vocaliza con frecuencia, pero ocasionalmente produce un suave chirrido en vuelo.

Nombre científico: Nydropsalis climacocerca
Dimensiones: 22-27cm

Ladder-tailed Nightjar

Foto: Jorge Vera

Large Nightjar from the beaches in the lowlands. It is Grayish brown with indistinct pale markings and a fairly long tail; in flight, males show large white wedges on the outer tail feathers. During the day it rests in the vegetation along the shores of lakes and rivers and forages on the beaches at night. It does not vocalize frequently, but occasionally produces a soft chirp in flight.



Mosquero Variegado

Tiránido mediano encontrado comúnmente en dosel, bordes de bosque, sabanas y zonas urbanas en donde suelen posarse a menudo en ramas expuestas. Toma en cuenta su complejo patrón de la cabeza: máscara y corona negras así como amplias cejas y bigoteras blancas. Posee un parche coronario amarillo, el cual a menudo está oculto. Su cuerpo es rayado con rabadilla y cola canelas. Es similar a Piratic Flycatcher (Legatus leucophaius), pero es más grande y pálido, posee canela en la cola y en la rabadilla y tiene alas mucho más marcadas. Su llamado es un nasal: "psiiiu".

Nombre científico: Empidonomus varius
Dimensiones: 18-19 cm

Variegated Flycatcher

Foto: Carlos Landazuri

Medium tyranid, commonly found in canopy, forest edges, savannas, and urban areas where they often perch on exposed branches. It has a complex head pattern: black mask and crown, as well as wide white eyebrows and mustaches. It has a yellow coronary patch, which is often hidden. Its body is striped with a cinnamon rump and tail. It is similar to the Piratic Flycatcher (Legatus leucophaius), but is larger and paler, has cinnamon on the tail and rump, and has much more pronounced wings. Its call is a nasal: "psiiiu".

Tangara Golondrina

Tangara pequeña única, ampliamente distribuida en tierras bajas y estribaciones hasta 1,800 m. El macho es azul cerúleo brillante con una máscara negra, la parte baja del vientre blanca y algunas barras negras en los lados. La hembra es verde musgo, con el vientre amarillo pálido y barras oscuras en los lados. Su comportamiento es muy diferente al de otras tangaras: se percha en posición vertical, a menudo en ramas expuestas o en las copas de árboles, y sale en busca de insectos como un mosquero. Usualmente se ve en parejas o pequeños grupos dispersos. Se encuentra en los bordes del bosque, claros o jardines..

Nombre científico: Tersina viridis
Dimensiones: 15-16cm

Swallow tanager

Foto: Carlos Iandazuri

Unique small tanager, it is widely distributed in lowlands and foothills up to 1,800 m. the Male is bright cerulean blue with a black mask, white lower belly, and some black bars on the sides. The female is moss green, with a pale yellow belly and dark bars on the sides. Its behavior is very different from other tanagers: it perches upright, often on exposed branches or in the treetops, and goes out in search of insects like a flycatcher. It is usually seen in pairs or small scattered groups. It is found on the edges of the woods, clearings, or gardens.

Saltador Grisáceo

Ave común pero tímida de tierras bajas tropicales tanto húmedas como secas. Prefiere el borde del bosque, matorrales de vegetación secundaria y arbustos, especialmente con flores de Ipomea y otras en forma de trompeta, de las que se alimenta con gusto. Se distingue de otros Saltadores en México y Centroamérica por las partes superiores grisáceas (no verde-dorado), cejas blancas marcadas y pecho liso. Las aves jóvenes se ven ligeramente diferentes, con un deslavado amarillento en la cara y las partes superiores.

Nombre científico: Saltator coerulescens
Dimensiones: 20-21 cm

Greyish Saltator

Foto: Carlos Landazuri

Common but shy bird of both humid and dry tropical lowlands. It prefers the edge of the forest, thickets of secondary vegetation and shrubs, especially with Ipomea flowers and others in the shape of a trumpet, on which it feeds with pleasure. It distinguishes from other Saltadores in Mexico and Central America by grayish (not green-gold) upperparts, marked white eyebrows, and smooth chest. Young birds look slightly different, with a yellowish wash on the face and upper parts.

Saltarín Cola de Alambre

Saltarín espectacular con filamentos caudales muy largos y ojos blancos penetrantes. El macho es amarillo brillante desde la cara hasta la región ventral y rojo brillante desde la corona hasta el manto; por lo demás es negro. La hembra es verde oliva opaco con un matiz amarillo en la barbilla y el pecho y tiene los filamentos caudales más cortos. Normalmente presente cerca de arroyos en bosques húmedos, incluyendo los bosques de galería y el bosque secundario maduro.

Nombre científico: Pipra filicauda
Dimensiones: 11-12 cm

White-tailed Manankin

Spectacular jumper bird with very long tail filaments and piercing white eyes. The Male is bright yellow from the face to the ventral region and bright red from the crown to the mantle; otherwise it is black. The female is dull olive green with a yellow tinge on the chin and chest and has shorter caudal filaments. It is typically found near streams in moist forests, including gallery forests and mature secondary forest.

Foto: Jorge Vera

Cabezón Aliblanco

Los cabezones son reminiscentes de los mosqueros; son de tamaño mediano y tienen una cabeza bastante plana. Varían geográficamente: los machos en el norte y el oeste son de color gris con gorra y espalda negras; en el Amazonas son mayormente negro, y ambas formas tienen marcas blanco y negro contrastante en las alas. La hembra es poco descriptible con la cara algo lisa y partes inferiores amarillo pálidas. Busca sus barras alares y puntas de la cola beige. Ambos sexos son similares a Black-and-white Becard; busca la espalda negra del macho y la cabeza lisa de la hembra (sin la gorra rufa y la línea negra). Individualmente o en parejas se encuentran en áreas boscosas, pero no usualmente dentro del bosque maduro; prefieren bordes y bosque secundario. Generalmente se encuentra en los niveles medios en los árboles.

Nombre científico: Pachyramphus polychopterus
Dimensiones: 15- 17 cm

Foto: Carlos Landazuri

White-winged Becard

The White-winged Becards are reminiscent of the flycatchers; they are medium in size and have a fairly flat head. They vary geographically: males from the north and west are gray with a black cap and back; in the Amazon they are mostly black, and both forms have contrasting black and white markings on the wings. The female is nondescript with a somewhat smooth face and pale yellow underparts. She looks for its beige wingbars and tail tips. Both sexes are similar to Black-and-white Becard; the male has a black back and the female has a smooth head (without the rufous cap and black line). Individually or in pairs they are found in wooded areas, but not usually within mature forest; they prefer edges and secondary forest. They are generally

Ermitaño Pechicanelo

Ermitaño bastante grande con partes inferiores rojizas y sin las plumas centrales de la cola alargadas. El pico largo curvado tiene la parte inferior amarilla. La cola redondeada es principalmente rojiza en la base con una banda negra y pequeñas puntas blancas en cada pluma. Superficialmente similar a otros ermitaños, pero la combinación de la forma de la cola y el color de la parte inferior debería ser suficiente para identificar. No hay traslape de rango con el muy similar Bronzy Hermit. Una especie de sotobosque bastante tímida y que se ve con más frecuencia alimentándose de flores de Heliconia

Nombre científico: Glaucis hirsutus
Dimensiones: 9-10 cm



Foto: Jorge vera

Rufous-breasted Hermit

Fairly large with reddish underparts and without elongated central tail feathers. Its long curved bill has a yellow underside. Its rounded tail is mainly reddish at the base with a black band and small white tips on each feather. It is superficially similar to other hermits, but the combination of the shape of the tail and the color of the underside should be sufficient to identify. There is no overlap in rank with the very similar Bronzy Hermit. A rather shy understory species that is most often seen feeding itself on Heliconia flowers.

Heliomáster Piquilargo

Colibrí grande de selvas perennifolias y sus bordes en tierras bajas; no es común. Se alimenta principalmente en el dosel, pero también sobre claros y arroyos, donde atrapa insectos al vuelo, de forma un poco errática. Note el pico obscuro largo y recto, garganta obscura rodeada por un bigote blancuzco y ancho, corona turquesa, parche blanco arriba de la rabadilla. Los sexos se ven similares, el inmaduro carece del color rojo de la garganta (el cual es muy difícil de ver; la garganta suele verse negra). Usualmente tiene un punto blanco atras de los ojos en vez de una línea blanca, y flancos verdes en vez de oscuros a diferencia del Plain-capped Starthroat.

Nombre científico: Heliomaster longirostris
Dimensiones: 11-12cm

Long billed starthoadt

Foto: Diogenes Andi

Large hummingbird of evergreen forests and edges in lowlands; it's not common. It feeds mainly in the canopy, but also on clearings and streams, where it catches insects on the fly, a bit erratically. It has a straight dark bill, a dark throat surrounded by broad whitish mustache, turquoise crown, and a white patch above rump. Both sexes look similar, the fledging one lacks the red color of the throat (which is very difficult to see; its throat is often black). It Usually has a white spot behind the eyes instead of a white line, and green instead of dark flanks unlike the Plain-capped Starthroat.

Amazilia Gorgibrillante

Colibrí pequeño bastante común. Mayormente verde metálico con una mancha blanca detrás de los ojos, la mandíbula inferior anaranjada, el abdomen pálido y una cola azul-negro con la base verdosa. Ambos sexos son similares. Las subespecies difieren en la cantidad de azul en la garganta. Se encuentra en una variedad de hábitats abiertos y semiabiertos, pero evita los interiores de bosques, las sabanas y las áreas urbanas.

Nombre científico: Amazilia fimbriata
Dimensiones: 8-9 cm

Glittering-throated Emerald

Fairly common small hummingbird. It is mostly metallic green with a white patch behind the eyes, an orange lower jaw, a pale abdomen, and a blue-black tail with a greenish base. Both sexes are similar. The subspecies differ in the amount of blue in the throat. It is found in a variety of open and semi-open habitats, but avoid forest interiors, savannas, and urban areas.

Foto: Jorge Vera

Tirano Picabuey

Mosquero de tamaño mediano con un rango bastante extendido en Suramérica. Superficialmente se asemeja a un Tropical Kingbird con la espalda marrón oliva, el vientre amarillo y la corona grisácea. Sin embargo, Cattle Tyrant es único porque típicamente se encuentra en o cerca del suelo, donde parejas o pequeñas bandadas siguen animales que andan pastando. Se encuentra en hábitats abiertos, incluidas tierras de cultivo y pantanos.

Nombre científico: Machetornis rixosa
Dimensiones: 19-20 cm

Cattle Tyrant

Foto: Diana Ante

Medium-sized flycatcher with a fairly extended range in South America. Superficially it resembles a Tropical Kingbird with an olive brown back, yellow belly, and greyish crown. However, Cattle Tyrant is unique in that it is typically found on or near the ground, where pairs or small flocks follow grazing animals. It is found in open habitats, including farmland and swamps.

Turpial Dorsinaranja

Bolsero grande, anaranjado con negro, posee un parche de piel desnuda alrededor del ojo. Tiene cola, alas y cara negras, ojos amarillo claro y parche alar blanco. Ambos sexos son similares. Ave característica de la cuenca amazónica, donde es el único bolsero grande anaranjado con negro. Encontrado en bosque secundario, bordes de bosque y en áreas suburbanas, frecuentemente cerca del agua. Presta atención a su canto, una lenta serie de silbidos.



Orange-backed Troupial

Foto: Josue Chavez

Large orange and black purse with a patch of bare skin around the eye. It has a black tail, wings, and face, light yellow eyes, and a white wing patch. Both sexes are similar. Particular bird of the Amazon basin, where it is the only large orange and black purse. It is found in secondary forest, forest edges, and in suburban areas, often near water. Pay attention to their singing, a slow series of whistles.

Mosquero Culiblanco

Mosquero distintivo negro, gris y blanco de la parte media y del dosel del bosque lluvioso. De tamaño mediano con una pequeña cresta densa; blanco abajo, gris arriba con la cabeza, las alas y la cola negras. Se encuentra en el bosque maduro y en los bordes del bosque, especialmente cerca del agua. Sus llamadas son silenciosas, pero hacen que sea mucho más fácil de localizar; escucha por un musical "piu, pip"

Nombre científico: Sirystes albocinereus
Dimensiones: 18-19 cm

White-rumped Sirystes

Foto: Alex Boas

Distinctive black, gray and white flycatcher of the rainforest. Medium in size with a small dense crest; white below, gray above with black head, wings and tail. It can be found in mature forest and on forest edges, especially near water. Its calls are silent, but they make it much easier to locate; listen for a musical "piu, pip"

Trepatroncos Gorgipunteado

Trepatroncos pequeño y difícil de identificar, muy extendido, pero a menudo raro y poco frecuente. Es más pequeño que la mayoría de los trepatroncos en su rango de distribución (ligeramente más grande que Olivaceous Woodcreeper (Sittasomus griseicapillus)), tiene un pico relativamente corto y recto y un plumaje marrón débilmente marcado. Toma en cuenta el tenue rayado pálido en la cabeza y los puntos en la garganta. Es más fácil encontrarlo e identificarlo por su vocalización, un trino rápido y uniforme que dura entre 1 y 2 segundos, escuchado generalmente al amanecer.

Nombre científico: Certhiasomus stictolaemus
Dimensiones: 16-17cm

Spot-throated Woodcreeper

Small Woodcreeper. It is difficult to identify, it is widespread, but often rare and infrequent. It is smaller than most nuthatches in its range (slightly larger than Olivaceous Woodcreeper (Sittasomus griseicapillus)), it has a relatively short, straight bill, and faintly marked brown plumage. It has a faint pale streaking on the head and the dots on the throat. It is easier to find and identify by its vocalization, a fast and even trill lasting between 1 and 2 seconds, usually heard at dawn.

Foto: Jesenia Castillo

Trepatroncos Golianteado

Trepatroncos grande y ampliamente distribuido en los bosques de tierras bajas y bordes. La garganta beige es a menudo difícil de ver. Se identifica más fácilmente por su coloración marrón rojiza, estrías beige en la cabeza y el pecho, y un pico grueso relativamente largo. Con frecuencia se encuentra cerca de asentamientos humanos con bordes de bosque, pero también es común en los bosques más maduros. Muy vocal, es más a menudo escuchado que visto; escucha por una larga serie de notas "chiu, chiu, chiu..." que asciende y desciende en tono. El trepatroncos más común en la mayor parte de su rango

Nombre científico: Xiphorhynchus guttatus
Dimensiones: 25-26 cm

Buff-throated Woodcreeper

Nuthatch large and widely distributed in lowland and edge forests. Its beige throat is often difficult to see. It is most easily identified by its reddish-brown coloration, beige streaks on the head and chest, and a relatively long, thick bill. It is often found near human settlements with forest edges, but it is also common in more mature forests. Very vocal, it is more often heard than seen; its song is a long series of notes "chiu, chiu, chiu ..." rising and falling in pitch. It is the most common nuthatch in most of its range

Foto: Jesenia Castillo

Batará Mayor

Ave con un patrón impresionante pero muy secretiva de bordes de bosque, matorrales y enredaderas de tierras bajas tropicales húmedas; no es común. Se le escucha más seguido de lo que se le ve; canta típicamente desde adentro de zarzales muy enredados. Su canto sugiere el de un trogón, pero termina con un un gruñido, audible a poca distancia. Las partes superiores son negras en el macho y canela en la hembra. Ambos tienen partes inferiores blanco nítido, ojos rojos, picos robustos con gancho al final y crestas que pueden estar agachadas o paradas.

Nombre Ingles: Great Anstshrike
Nombre científico: Taraba major

Great Anstshrike

Foto: Carlos Landazuri

Bird with an impressive but highly secretive pattern of forest edges, scrub and humid tropical lowland vines; it's not common. it can be listened to more often than it can be seen; it typically sings from within very tangled brambles. Its song suggests that of a trogon, but ends with a growl, audible at a short distance. Its upper parts are black in the male and cinnamon in the female. Both have crisp white underparts, red eyes, robust hooked beaks, and crests that can be crouched and standing.

Mirlo Piquinegro

Un zorzal de pocos colores, común en hábitats abiertos y arboledas en las tierras bajas, pero también vagabundea en las estribaciones andinas. Mayormente marrón-grisáceo con el vientre blancuzco. Nota las rayas indistintas en la garganta; algunas poblaciones también muestran un parche blanco en el pecho. Sexos similares. Usualmente, se ve solo o en parejas. Conspicuo. El canto es una serie de frases musicales, típico de un zorzal.

Nombre científico: Turdus ignobilis
Dimensiones: 22-23 cm

Spot-throated Woodcreeper

Foto: Josue Chavez

Small Woodcreeper. It is difficult to identify, it is widespread, but often rare and infrequent. It is smaller than most nuthatches in its range (slightly larger than Olivaceous Woodcreeper (Sittasomus griseicapillus)), it has a relatively short, straight bill, and faintly marked brown plumage. It has a faint pale streaking on the head and the dots on the throat. It is easier to find and identify by its vocalization, a fast and even trill lasting between 1 and 2 seconds, usually heard at dawn.

Vaquero Gigante

Un vaquero bastante grande de tierras bajas tropicales. El macho es mucho más grande que la hembra. Se encuentra en los bordes de bosques, pastizales, plantaciones y áreas abiertas a lo largo de ríos; a menudo en grupos pequeños. En temporada de reproducción, merodea las colonias de oropendola. (Pone sus huevos en los nidos de las oropendolas y depende de ellas para criar a su descendencia.) El cuello grueso acentúa la cabeza pequeña con el pico muy fuerte y puntiagudo. El vuelo es fuerte y bastante directo, con una progresión distintiva de aleteo-aleteo-aleteo-deslizamiento. El color de los ojos varía: rojo en México y Centroamérica, amarillento en partes de Suramérica.

Giant Cowbird

Foto:Vilma Lucero

A fairly large cowboy bird from the tropical lowlands. The male is much larger than the female. It is found on the edges of forests, grasslands, plantations, and open areas along rivers; often in small groups. In breeding season, it roams the goldfish colonies. (It lays its eggs in the nests of the oropendolas and depends on them to raise its offspring.) Its thick neck accentuates its small head with the very strong and pointed bill. Its flight is strong and fairly direct, with a distinctive flap-flap-flap-glide progression. Its Eye color varies: red in Mexico and Central America, yellowish in parts of South America.

Trogón Dorsiverde

Hallado primeramente por su canto: una serie melódica de notas "cua cua cua cua" más rápida que la producida por el similar Surucua Trogon (Trogon surrucura). Posa silenciosamente en posición vertical durante largos períodos. Los machos tienen la espalda verde, la cabeza y el pecho azulados, y el vientre amarillo. La parte inferior de la cola es blanca con manchas oscuras. Las hembras tienen la cabeza y el pecho gris-marrón. Sus colas son similares a las de los machos, pero también tienen barras horizontales grises. Encontrado en niveles superiores e intermedios de bosques húmedos, en bordes de bosque, así como en bosques menos tupidos y bosques secundarios.

Nombre científico: Trogon viridis
Dimensiones: 28-29cm

Green-backed Trogon

Foto:Vilma Lucero

It is found primarily by singing: a melodic series of notes "cua cua cua cua" faster than that produced by the similar Surucua Trogon (Trogon surrucura). It silently poses in an upright position for long periods. Males have a green back, bluish head and chest, and a yellow belly. The underside of its tail is white with dark spots. Females have a gray-brown head and chest. Their tails are similar to those of males, but they also have gray horizontal bars. It is found in upper and intermediate levels of humid forests, on forest edges, as well as in less dense forests and secondary forests.

Trogón Coliblanco

Este trogón de vientre amarillo es bastante común desde Panamá hasta el oeste de Ecuador. Los machos tienen la cabeza y el pecho oscuro con índigo iridiscente, una iridiscencia turquesa o morado en la espalda y la parte inferior de la cola completamente blanca. Las hembras tienen la cabeza y el pecho más gris y la parte inferior de la cola barrada con puntas blancas grandes. Nota el anillo ocular azul claro. Compáralo con Gartered Trogon, que tiene un anillo ocular amarillo y un patrón diferente en la parte inferior de la cola (barrada con puntas blancas en los machos, más negro en las hembras). Se encuentra solo o en pares en bosques, bordes y jardines hasta aproximadamente 1,000 m.

Nombre científico: Trogon chionurus
Dimensiones: 22-23 cm

Foto:Humberto Castillo

Amazonian White-tailed Trogon

This yellow-bellied trogon is quite common from Panama to western Ecuador. Males have a dark head and chest with iridescent indigo, a turquoise or purple iridescence on the back, and a completely white underside of the tail. Females have grayer head and chest and lower tail barred with large white tips. It has a light blue eye ring. It can be compared to the Gartered Trogon, which has a yellow eyering and a different pattern on the underside of the tail (barred with white tips in males, blacker in females). It can be found singly or in pairs in forests, edges, and gardens up to about 1,000 m.

Tororoi Loriblanco

Gralaria tímida del bosque lluvioso de tierras bajas del este de Ecuador, del noreste de Perú y del sur de Colombia. Toma en cuenta la cabeza gris, los puntos blancos a ambos lados del ojo y también en el cuello, y el pecho y los flancos anteados con rayas oscuras. Similar a Amazonian Antpitta (Hylopezus berlepschi), pero White-lored Antpitta (Hylopezus fulviventris) tiene la cabeza gris y no es sabido que se solapen sus rangos de distribución. Habita en el denso sotobosque del bosque lluvioso, especialmente en áreas pantanosas, y puede ser frustrantemente difícil de detectar. Usualmente permanece en el suelo, pero puede cantar desde una percha ligeramente elevada desde donde puede ser un poco más fácil de ver. Su canto es una serie lenta y uniformemente espaciada de tres a seis ululatos huecos.

Nombre científico: Hylopezus fulviventris
Dimensiones: 14-15cm

White-lored Antiptta

Shy gralaria from the lowland rainforest of eastern Ecuador, northeastern Peru, and southern Colombia. It has a gray head, white spots on both sides of the eye and also on the neck, and the dark-striped buffy chest and flanks. It is similar to Amazonian Antpitta (Hylopezus berlepschi), but White-lored Antpitta (Hylopezus fulviventris) has a gray head and their ranges of distribution are not known to overlap. It inhabits the dense understory of the rainforest, especially swampy areas, and can be frustratingly difficult to detect. It usually stays on the ground, but can sing from a slightly elevated perch from where it can be a little easier to see. Their song is a slowly and evenly spaced series of three to six hollow hoots.

Polluela Burrito

A menudo común, pero normalmente difícil de ver. Hallada más fácilmente por su vocalización, un muy largo y explosivo trino. Por encima es marrón oliva, su cara y lados son rufos, posee llamativas barras blanquinegras en los flancos y en las coberteras subcaudales. Similar a Red-and-white Crake (Laterallus leucopyrrhus), la cual carece de "gorra" oscura. Encontrada en praderas húmedas, humedales extensos, y a veces en frondosos pastizales con crecimiento desmesurado.

Nombre científico: Laterallus melanophaius
Dimensiones: 15-18 cm

Foto: Josue Chavez

Rufous-sided Crake

Often common, but usually difficult to see. Easily found by its vocalization, a very long and explosive trill. It is olive brown at the bottom, its face and sides are rufous, it has striking black and white bars on the flanks and on the subcaudal coverts. It is Similar to Red and White Crake (Laterallus leucopyrrhus), which lacks a dark "cap". It is Found in damp grasslands, extensive wetlands, and sometimes in lush, overgrown grasslands.

Cuervo Higuero Cuellipelado

Ave inusual, de tamaño medio, de dosel del bosque en la Amazonía. Mayormente azul oscuro con piel azul, desnuda y arrugada en el cuello y pico pálido. Los machos tienen parches alares gris pálido. Se percha en las copas de los árboles en el dosel del bosque lluvioso y con frecuencia se ve volando a través de ríos y claros de bosques. En vuelo, a menudo mantiene el cuello estirado con la cabeza pequeña ligeramente inclinada. A veces puede parecer que desaparece de un sitio por períodos de tiempo, pues es parcialmente nómada y sigue eventos de fructificación estacionales.

Nombre científico: Gymnoderus foetidus
Dimensiones: 32-38cm

Bare-necked Fruitcrow

Foto: Josue Chavez

Unusual, medium-sized, forest canopy bird in the Amazon. It is mostly dark blue with blue skin, naked and wrinkled at the neck and a pale bill. Males have pale gray wing patches. It perches in the treetops in the rainforest canopy and is often seen flying through rivers and forest glades. In flight, it often keeps its neck straight with its small head slightly tilted. It can sometimes appear to disappear from a site for periods of time, as it is partially nomadic and follows seasonal fruiting events.

Anexos

Personal de Reserva Biológica Limonconcha
Agradece a todos las personas que nos facilitaron las fotografias;
Jorge Vera. Humberto Castillo, Carlos Landazuri,
Paolo Escobar, Diana Ante

Nombre común: Rana venenosa ecuatoriana
Nombre Científico: *Ameerega bilinguis*

Identificación: Machos Longitud Rostro-cloacal Promedio = 18.3 mm
Hembras Longitud Rostro-cloacal Promedio = 20.4 mm
Es una rana pequeña de dorso negro recubierto con tubérculos aplanados rojos, con manchas amarillas en brazos y muslos y vientre azul claro con manchas negras irregulares.
Alimentación: Se alimenta de hormigas y larvas de coleópteros pueden ingerir hasta 598 hormigas. (Ron y Coloma, 2019).

Nombre común: Rana mono verde naranja
Nombre cientifico: *Phyllomedusa tomopterna*

Identificación: Es una rana grande de color verde con puntos blancos dispersos, ingles y superficies internas de las extremidades naranjas con franjas púrpura y vientre naranja pálido.
Pone los huevos en un nido generalmente hecho de una sola hoja doblada, encima del agua
Dieta: Las arañas son el ítem más importante de su dieta (Ron y Read, 2021).

Cutín de Zamora

Identificación: Es una rana de tamaño mediano.
Machos Longitud Rostro-cloacal Promedio = 27.3 mm (rango 23.2–30.1; n = 29)
Hembras Longitud Rostro-cloacal Promedio = 40.2 mm (rango 34.8–48.8; n = 19)
Habita bosques lluviosos tropicales de tierras bajas, es una especie conspicua, se ha encontrado en bosques primarios y secundarios. La mayoría de los individuos están en vegetación baja durante la noche.

Nombre común: Rana Punteada
Nombre científico: *Boana Punctata*

Tamaño: Machos Longitud Rostro-cloacal rango = 31–40 mm
Hembras Longitud Rostro-cloacal Promedio = 36.9 mm (rango 34.0–41.7; n = 20)
Es una rana mediana de color verde amarillento con líneas dorsolaterales y puntos rojos dispersos. Tiene cabeza ancha, hocico redondeado y discos expandidos en los dedos
Dieta: Se alimentan de dípteros, seguidos por hemípteros, homópteros y coleópteros.

Nombre común: Libélula flecha roja
Nombre científico: *Sympetrum sanguineum*

Descripción: Insecto fascinante, de esbelta figura de color rojo, prefieren sitios de hábitat las zonas húmedas y pantanosas por ello es más frecuente verla cerca de los ríos, riachuelos y lagos de las zonas donde habita.
Tamaño: 35-40 cm.
Alimentación: La libélula se alimenta de insectos como los mosquitos, moscas, abejones, los cuales logra atrapar gracias a su agudeza visual y rapidez para volar.

Nombre común: Corales de Hemprich
Nombre científico: *Micrurus hemprichii*

Descripción: Serpiente venenosa diurna, hocico y dorso de la cabeza hacia el borde posterior de las parietales, mental y primer par de infralabiales negros.
Tamaño: 300 a 362 mm de longitud
Alimentación: Se alimenta de onicóforos (Peripatus), serpientes pequeñas y anfisbenas.

Boa Matacaballo

Descripción: Es una especie crepuscular o nocturna, no es una especie venenosa, pueden tener hábitos terrestres o semiarborícola, no son agresivos, sin embargo, pueden atacar y morder en defensa propia.

Tamaño: Longitud entre 2 a 3 m, ocasionalmente alcanzan los 5 m, teniendo en cuenta que su técnicas de caza varían entre esperar y emboscar hasta un forrajeo activo.

Alimentación: Se alimenta de mamíferos, aves, lagartijas y anfibios.

Nombre científico: Boa constrictor

Nombre común: Lagartijas de palo cabezonas
Nombre científico: *Enyalioides laticeps*

Descripción: Estas lagartijas son diurnas, abundantes en bosques primarios y secundarios; se las puede encontrar sobre el suelo, arbustos, árboles pequeños y troncos de árboles con diámetros menores a 15 cm.
Tamaño: Los machos adultos de E. laticeps alcanzan una longitud rostro-cloaca aproximada de 157 mm, mientras que las hembras de esta especie alcanzan los 133 mm.
Alimentación: Se alimentan de arañas, orugas y larvas de escarabajos; otras presas comunes son saltamontes, grillos y lombrices de tierra.

Nombre común: Lagartija tropical de cola espinoza
Nombre cientifico: *Uracentron flaviceps*

Tamaño: La longitud rostro-cloacal varía de 88 a 130 mm en machos adultos y de 83 a 96 mm en hembras adultas. Además del dimorfismo sexual en tamaño (machos más grandes que las hembras), los machos tienen las cabezas y extremidades más largas.
Alimentación: Es una lagartija especialista que prefiere alimentarse de hormigas y se sugiere que pueden destruir los nidos de éstas para alimentarse. Por otro lado, se han reportado también melipónidos y coleópteros en su dieta.

Nombre común: Mono aullador rojo de Linneo
Nombre científico: *Alouatta seniculus*

Descripción: Son especies diurnas y arbóreas. Pueden formar grupos de entre tres y siete individuos. En la Amazonia suelen vivir en las orillas de los lagos y ríos, suelen encontrarse en menor proporción en zonas muy boscosas.
Tamaño: Tienen una longitud cabeza-cuerpo de 44 a 69 cm, y 54 a 79 cm para su cola. Los machos tienen un peso promedio de 7,5 kg y las hembras de 6,3 kg
Alimentación: Su alimentación es de hojas tiernas, frutas, hojas maduras, flores y peciolos.

Mono Leoncillo

Tamaño: Longitud 12-15 cm
La gestación suele durar entre 19 y 20 semanas ocurre 2 veces
por años,tiene 1 a 3 crías, pero es frecuentemente el parto de gemelos (Soini. 1982).
Alimentacion: Su dieta se basa en saltamontes,polillas, marposas diurnas, libelulas y lagartijas

Nombre científico: Cebuella pygmaea

Mono Ardilla de Humboldt

Descripción: Se trata de una especie de tamaño mediano. El dorso es dorado oliváceo con ligeros tintes negros. El hocico es negruzco y se observa una máscara blanca alrededor de los ojos. Las orejas están cubiertas de pelo y son algo puntiagudas. Los lados del cuello, bajo las orejas, son blancos.

Alimentación: Se alimentan principalmente de insecto, y de manera secundaria consume frutos.

En un análisis de forrajeo se ha encontrado que las hembras se alimentan de insectos más de lo que los machos.

Nombre científico: Saimiri cassiquiarensis

Tití Rojizo

Descripción: Se trata de una especie pequeña que presenta el pelaje largo y denso. La cabeza es de forma redondeada con el rostro pequeño y aplanado sin mucho pelaje el cual es de color negruzco que contrasta con el mentón (Tirira, 2007). La frente presenta una franja blanquecina sobre las cejas que contrasta con la franja marrón oscura, este contrasta con la corona y patillas rojizas

Alimentación: Este titi es diurno, arborícola y aparentemente territorial se alimenta de frutos, hojas, flores y tallos de 30 especies vegetales, siendo la familia Fabaceae la más consumida. (Vallejo y Boada, 2016).

Nombre científico: Plecturocebus discolor

Tamarin de Dorso Negro

Descripción: Es un primate de pequeño tamaño, presenta la corona y el manto de color negruzco o agutí marrón oscuro, de forma más o menos cuadrado que no se extiende más allá de la parte media de la espalda. La parte restante de la espalda, los flancos del cuerpo, la rabadilla y los 5-16 cm proximales de las superficies dorsal y ventral es de color beige de aspecto canoso, detrás de la cola, el cuello y el vientre tiene una coloración cremosa

Alimentación: Su dieta comprende frutos, exudados, flores, néctar, insectos, semillas y lagartijas. (Vallejo y Boada, 2016).

Nombre científico: Leontocebus nigricollis

Nombre común: Charapa grande
Nombre cientifico: *Podocnemis expansa*

Tamaño: Esta especie es la más grande de las tortugas dulceacuícolas del neo trópico, con individuos que pueden alcanzar los 890 mm de longitud del caparazón. Presenta dimorfismo sexual las hembras son más grandes que los machos. Los machos tienen una longitud de 400-500 mm de longitud del caparazón, mientras que las hembras 500-890 mm de longitud del caparazón.

Alimentación: Su dieta varía ontogenética mente, los neonatos y juveniles son omnívoros, consumen tallos, hojas, frutos, semillas, flores e invertebrados (por ejemplo, esponjas de agua dulce). Mientras que los adultos son herbívoros, con un porcentaje alto de dieta frugívora y consumo de semillas, aunque se ha reportado el consumo de pescado podrido, crustáceos, moluscos y peces pequeños. Carvajal y Rodríguez, 2010).

Nombre común: Perezoso de garganta marron
Nombre científico: *Bradypus variegatus*

Descrpción: Este perezoso tiene la garganta y los costados de la cara de color marrón a marrón grisáceo, esta coloración se extiende hacia el pecho y los hombros. Posee manchas de color blanco en la parte posterior del dorso y en las patas.
Tiene las patas traseras más largas que las delanteras (Wislocki, 1928) las garras de las patas delanteras que miden entre 70 a 80 mm de largo y las garras traseras miden de 50 a 55 mm.
Alimentación: su dieta comprende en su mayoría hojas jóvenes, consumen 138 kg de comida por año, es decir, casi el 2% de la producción anual de hojas.

Flor de balsa amazónico

El F lor de balsa a mazónico. Es u n miembro pequeño del o rden d e los perezosos y hormigueros Tamaño: en promedio un individuo adulto mide alrededor de 430 mm y pesa unos 235 g. posee una serie de adaptaciones morfológicas asociadas a su dieta especializada, su hocico es alargado y tubular; su lengua es también alargada, vermiforme y protráctil; no poseen dientes.

Alimentación: es una especie arborícola estricta, nocturna y solitaria, que se alimenta casi exclusivamente de hormigas) aunque p robablemente deprede d e manera ocasional y oportunista otros insectos (Gardner, 2007).

Nombre científico: Cyclopes ida

Puerco Espín Pequeño Ecuatoriano

Descripción: C-C: 44-56 CM c: 33-58 CM p: 3,2-5,8 kg
Tamaño corporal grande. El dorso está cubierto de espinas de color blanco o amarillo pálido en la base y en la punta negras o pardo oscuras en el centro. Las espinas de la cabeza y las patas son cortas, las del dorso son más largas y gruesas.
Usualmente se mueve con lentitud, sin embargo, es muy ágil y puede trepar velozmente usando los pies y la cola para moverse entre las ramas: en una noche puede desplazarse hasta 700 metros.
Alimentación: se alimenta de semillas, frutos hojas y ocasionalmente de corteza.

Nombre científico: Coendou ichillus

Caimán de anteojos

Tamaño: En esta especie existe dimorfismo sexual secundario, donde los machos son más grandes que las hembras, Los machos pueden alcanzar un tamaño máximo de 150 cm de longitud rostro-cloacal y las hembras 81,2 cm.

Alimentación: Son animales carnívoros, generalistas. Su dieta varía al tamaño de los individuos. Las crías y juveniles (menores a 1 m) se alimentan principalmente de crustáceos, moluscos e invertebrados terrestres; al crecer, estos caimanes consumen otros grupos de animales, como aves, reptiles, anfibios, pequeños mamíferos y peces, siendo este último el grupo más frecuente en su dieta.

Nombre científico: Caiman crocodilus

Caimán negro

El Tamaño: adultos llegan a medir hasta 6 metros de longitud, el tamaño promedio del individuo es de 2,8 m.
Alimentación: los neonatos juveniles se alimentan de insectos, anfibios, moluscos, crustáceos. Los adultos consumen principalmente peces, tortugas, lagartijas y otros caimanes incluyendo crías.

Nombre científico: Melanosuchus niger

Bibliografía

(eBird, https://ebird.org/species/crcwoo1?siteLanguage=es, 2021)
(Bioweb, 2021)

bioWED. (8 de julio de 2020). https://bioweb.bio/faunaweb/ vesweb/ListaEspeciesPorFamilia/3431. Obtenido de https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/ListaEspeciesPorFamilia/3431.

eBird. (8 de Julio de 2020). https://ebird.org/species/horscr1/L5838027. Obtenido de https://ebird.org/species/horscr1/L58380271.

Restall, J. F. (2018). Birds of Ecuador .

(Freile, J. F., Poveda, , 2021)

Reserva Biológica Limoncocha

Dir: Km 31 Vía Pompeya, Parroquia Limoncocha,
Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbios

Facebook. Reserva Biológica Limoncocha

Telf. 062338062

República del Ecuador

Gobierno del Encuentro

Juntos lo logramos

Humedal de Importancia Internacional
RAMSAR

Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica